

# Modern World Coins

## 外币收藏 现代

特辑一

世界自然基金会  
野生动物系列纪念币

(上册 —1970s)



*for a living planet®*



现代·外币收藏  
(特辑一·上册)  
  
世界自然基金会  
野生动物纪念币  
—— 1970s

Modern World Coins  
(Extra Edition. Vol 1a)  
  
World Wide Fund for Nature  
Wild Animals Coins  
—— 1970s

## 《外币收藏》 钱币世界中的百科丛书

现代卷 特辑一  
世界自然基金会 - 野生动物纪念币  
(上册 —1970s)

2011年9月 第一版

如想订阅或对本系列丛书有任何意见或建议，请联系 [bose\\_zhang@yahoo.com.cn](mailto:bose_zhang@yahoo.com.cn)  
<http://blog.sina.com.cn/worldcoins>  
msn: [bose2008@hotmail.com](mailto:bose2008@hotmail.com)

# CONTENTS



渡渡鸟于1681年灭绝；

白令海峡史德拉海牛于1768年灭绝；

.....

中国豚鹿于1960年灭绝；

墨西哥灰熊于1964年灭绝；

爪哇虎于1980年灭绝；

.....

.....

地球上自从35亿年前出现生命以来，已有5亿种生物生存过，如今绝大多数早已消逝。物种灭绝作为地球上生命进化史的一种自然现象，本是正常事件，如2.5亿年前的三叶虫、6500万年前的恐龙均已灰飞烟灭。但是，自从人类进入工业社会，目空一切地参与大自然的事务以后，使这个灭绝时间表大大地提前了。

据联合国环境规划署的一份报告说：目前世界上每分钟有1种植物灭绝，每天有1种动物灭绝。这种远远高于自然的“本底灭绝”速率上千倍的局面是有关地球生命生存状况与质量的严峻警告！

野生动物一直是钱币选题中的宠儿。真的不希望有一天，我们只能通过这一枚枚硬币来怀念它们……

**P2** 目录页

**P3** 世界自然基金会

**P4** 世界自然基金会  
野生动物系列纪念币概况

**P6** 野生动物系列纪念币 ——1970s

**P79** 附录：汇总





# 世界自然基金会

## World Wide Fund for Nature

世界自然基金会（缩写：WWF），是在全球享有盛誉的、最大的独立性非政府环境保护机构之一，在全世界拥有将近500万支持者和一个在90多个国家活跃着的网络。

世界自然基金会成立于1961年，总部设于瑞士。目前世界自然基金会通过由27个国家级会员、21个项目办公室及5个附属会员组织组成的一个全球性网络，在北美洲、欧洲、亚太地区及非洲开展工作。

WWF的使命是遏止地球自然环境的恶化，创造人类与自然和谐相处的美好未来。为此WWF致力于：

保护世界生物多样性；

确保可再生自然资源的可持续利用；

推动降低污染和减少浪费性消费的行动。

世界自然基金会最终目标是制止并最终扭转地球自然环境的加速恶化，并帮助创立一个人与自然和谐共处的美好未来。



A FRAGILE WORLD NEEDS A STRONG GUARDIAN.





世界自然基金会  
野生动物系列纪念币

二十世纪七十年代，世界自然基金会完成了一次创举：在24个不同的国家发行了系列野生动物纪念币。这也拉开了WWF与各国政府联合发行野生动物题材纪念币的序幕。参与这次发行计划的（也是本次特辑中所介绍的）国家有：阿富汗，博茨瓦纳，哥伦比亚，印度尼西亚，约旦，马拉维，马来西亚，毛里求斯，蒙古，尼泊尔，阿曼，巴基斯坦，塞舌尔，苏丹，坦桑尼亚，泰国，委内瑞拉，哥斯达黎加，埃塞俄比亚，斐济，福克兰群岛，冈比亚，扎伊尔（现民主刚果）和赞比亚。

首轮的动物纪念币由英国皇家造币厂同意铸造。每个国家均发行了2枚银币，均以92.5%的纯银铸造。较大的硬币直径42毫米，1.041盎司。较小的硬币直径38.61毫米，0.841盎司。为方便收集，有部分国家铸造了较低含银量、但币面尺寸、图案完全相同的硬币。

各国所发行的纪念币包括有：

发行国家	（克劳斯编号）面值	主题动物	保护状况	（克劳斯编号）面值	主题动物	保护状况
阿富汗 Afghanistan	[KM# 978] 250 AFGHANIS	雪豹 Snow Leopard	濒危（EN）	[KM# 980] 500 AFGHANIS	白鹤 Siberian Crane	极危（CR）
博茨瓦纳 Botswana	[KM# 11] 5 PULA	南非剑羚 Gemsbok	无危（LC）	[KM# 12] 10 PULA	山羚 Klipspringer	无危（LC）
哥伦比亚 Colombia	[KM# 264] 500 PESOS	奥里诺科鳄 Orinoco Crocodile	极危（CR）	[KM# 265] 750 PESOS	栗腹蜂鸟 Chestnut-Bellied Hummingbird	濒危（EN）
哥斯达黎加 Costa Rica	[KM# 200] 50 COLONES	绿海龟 Green turtles	濒危（EN）	[KM# 201] 100 COLONES	西印度海牛 West Indian Manatee	易危（VU）
埃塞俄比亚 Ethiopia	[KM# 61] 10 BIRR	胡秃鹫 Bearded Vulture	无危（LC）	[KM# 62] 25 BIRR	山藪羚 Mountain Nyala	濒危（EN）
斐济 Fiji	[KM# 41] 10 DOLLARS	黑脸鹦雀 Pink-billed parrotfinch	易危（VU）	[KM# 42] 20 DOLLARS	黄金宝螺 Golden cowrie	无危（LC）
福克兰群岛 Falkland Islands	[KM# 11] 5 POUNDS	座头鲸 Humpback Whale	无危（LC）	[KM# 12] 10 POUNDS	短翅船鸭 Falkland Steamer Duck	无危（LC）
冈比亚 Gambia	[KM# 17] 20 DALASIS	距翅雁 Spur-winged Goose	无危（LC）	[KM# 18] 40 DALASIS	土豚 Aardvark	无危（LC）
印度尼西亚 Indonesia	[KM# 39] 2000 RUPIAH	爪哇虎 Javan tiger	绝灭（EX）	[KM# 40] 5000 RUPIAH	婆罗洲猩猩 Bornean Orangutan	濒危（EN）
约旦 Jordan	[KM# 31] 2-1/2 DINARS	细角瞪羚 Rhim Gazelle	濒危（EN）	[KM# 32] 3 DINARS	巴勒斯坦太阳鸟 Palestine Sunbird	无危（LC）
马拉维 Malawi	[KM# 15] 5 KWACHA	斑马 Zebras	无危（LC）	[KM# 16] 10 KWACHA	黑马羚 Sable Antelope	无危（LC）
马来西亚 Malaysia	[KM# 19] 15 RINGGIT	马来野牛 Malayan Gaur	易危（VU）	[KM# 20] 25 RINGGIT	马来犀鸟 Rhinoceros Hornbill	近危（NT）
毛里求斯 Mauritius	[KM# 40] 25 RUPEES	非洲青凤蝶 Blue Swallowtail	无危（LC）	[KM# 41] 50 RUPEES	毛里求斯隼 Mauritius Kestrel	易危（VU）
蒙古国 Mongolia	[KM# 36] 25 TUGRIK	盘羊 Argali sheep	近危（NT）	[KM# 37] 50 TUGRIK	双峰骆驼 Bactrian Camel	濒危（EN）
尼泊尔 Nepal	[KM# 839] 25 RUPEE	棕尾虹雉 Himalayan Monal Pheasant	无危（LC）	[KM# 841] 50 RUPEE	小熊猫 Red panda	易危（VU）
阿曼 Oman	[KM# 60] 2-1/2 OMANI RIALS	狞猫 Caracal	无危（LC）	[KM# 61] 5 OMANI RIALS	阿拉伯大羚羊 Arabian White Oryx	易危（VU）
巴基斯坦 Pakistan	[KM# 40] 100 RUPEES	黑头角雉 Western Tragopan	易危（VU）	[KM# 42] 150 RUPEES	恒河鳄 Gaviial Crocodile	极危（CR）
塞舌尔 Seychelles	[KM# 39] 50 RUPEES	红双棘鲷 Red Squirrelfish	无危（LC）	[KM# 40] 100 RUPEES	白尾鸚 White-tailed Tropicbird	无危（LC）
苏丹 Sudan	[KM# 70] 2-1/2 POUNDS	鲸头鹳 Shoebill	易危（VU）	[KM# 71] 5 POUNDS	河马 Hippopotamus	易危（VU）
坦桑尼亚 Tanzania	[KM# 7] 25 SHILINGI	长颈鹿 Giraffes	无危（LC）	[KM# 8] 50 SHILINGI	黑犀 Black Rhinoceros	濒危（EN）
泰国 Thailand	[Y#] 102 50 BAHT	苏门答腊犀牛 Sumatran Rhinoceros	极危（CR）	[Y#] 103 100 BAHT	坡鹿 Eld's Deer	濒危（EN）
委内瑞拉 Venezuela	[Y#] 46 25 BOLIVARES	美洲豹 Jaguar	近危（NT）	[Y#] 47 50 BOLIVARES	大犰狳 Giant Armadillo	易危（VU）
刚果民主共和国(原扎伊尔) Democratic Republic of the Congo	[KM# 9] 2-1/2 ZAIRES	山地大猩猩 Mountain gorillas	极危（CR）	[KM# 10] 5 ZAIRES	獾狓 Okapi	近危（NT）
赞比亚 Zambia	[KM# 18] 5 KWACHA	驴羚 Kafue Lechwe	无危（LC）	[KM# 19] 10 KWACHA	泰塔隼 Taita Falcon	近危（NT）

[ +链接 : 物种保护状况 Conservation status ]

物种的保护状况是指物种继续生存的可能性。很多因素都可能影响物种的保护状况：不仅仅是简单的生存数量，而是整个种群随着时间的增长或减少，喂养成功率，已知的威胁等等。

世界上最知名的物种保护状况的名录是由世界自然保护联盟 (International Union for Conservation of Nature , 缩写: IUCN) 所颁布的《濒危物种红色名录》 (IUCN Red List) 。它将物种的保护状态分为如下几个档次：

低风险 At lower risk

无危 ( Least Concerned , 缩写 : LC )

虽然存在威胁但是目前并不严重。英文直译为低关注，但并不是指该物种受到的关注少，而是威胁不严重，不用过分关注的意。当一分类单元被评估未达到极危、濒危、易危或者近危标准，该分类单元即列为无危。广泛分布和种类丰富的分类单元都属于该等级。

近危 ( Near Threatened , 缩写 : NT )

当一分类单元未达到极危、濒危或者易危标准，但是在未来一段时间后，接近符合或可能符合受威胁等级，该分类单元即列为近危。

受威胁 Threatened

易危 ( Vulnerable , 缩写 : VU )

当一分类单元未达到极危或者濒危标准，但是在未来一段时间后，其野生种群面临绝灭的机率较高时，该分类单元即列为易危。

濒危 ( Endangered , 缩写 : EN )

当一分类单元未达到极危标准，但是其野生种群在不久的将来面临绝灭的机率很高时，该分类单元即列为濒危。

极危 ( Critically Endangered , 缩写 : CR )

当一分类单元的野生种群面临即将绝灭的机率非常高时，该分类单元即列为极危。

灭绝 Extinct

野外绝灭 ( Extinct in the Wild , 缩写 : EW )

如果已知一分类单元只生活在栽培、圈养条件下或者只作为自然化种群 (或种群) 生活在远离其过去的栖息地时，即认为该分类单元属于野外绝灭。

绝灭 ( Extinct , 缩写 : EX )

如果没有理由怀疑一分类单元的最后一个个体已经死亡，即认为该分类单元已经绝灭。

\* 此外，还有一部分物种保护分级可能为：

数据缺乏 ( Data Deficient , 缩写 : DD )

指如果没有足够的资料来直接或者间接地根据一分类单元的分布或种群状况来评估其绝灭的危险程度时，即认为该分类单元属于数据缺乏。

根据2007年世界自然保护联盟濒危物种红色名录 ( IUCN Red List of Threatened Species ) ，全球目前有约1万6306种动植物面临灭绝危机，比2006年增加188种，占有参与评估的物种近40%。世界自然保护联盟的科学家在世界范围内调查了4万种动植物。根据统计，1/3的两栖动物、1/4的哺乳动物、1/8的鸟类和70%的植物都被列入“极危” (CR)、 “濒危” (EN) 或“易危” (VU) 三个级别，都属于生存“受威胁”的物种。除了这些面临灭绝危机的物种，还有785种动植物被正式归入“灭绝” ( EX ) 类别。此外，还有65种物种处于“野外绝灭” ( EW ) 状态，即仅存在于人工环境下。



世界自然基金会

野生动物纪念币 — 1970s





## 阿富汗伊斯兰共和国 Islamic Republic of Afghanistan

国土面积：647,500平方公里（世界第40名）

总人口：28,395,716人（世界第43名，2009.7）

首都：喀布尔（Kabul）

官方语言：达利语（波斯语）、普什图语

货币单位：阿富汗尼（Afghani）



阿富汗地处中亚的心脏地带，北方与土库曼、乌兹别克、塔吉克三国交接，东方和中国接壤，东南方与巴基斯坦交界，西方和伊朗交界，是一个内陆国家。其国土大部分地区属伊朗高原，平原仅分布在西南部和北部的小部分区域。从东北部到西南部横贯的兴都库什山脉将整个国家分开，形成一个瓦罕走廊（Wakhan Corridor）。

阿富汗属于亚热带干旱半干旱气候，干燥少雨，冬季较凉，夏季酷热。西斯坦巴新内流盆地是世界最干燥的地区之一。

2009年4月，阿富汗政府宣布建立了第一座国家公园——班达拉米亚（Band-e-Amir）。虽然公园内许多野生动物已经灭绝，但世界自然基金会表示，公园中仍然有多种包括北山羊和东方盘羊以及狼，狐狸，小哺乳动物和鱼类在这里安家。





# 雪豹 Snow leopard 【Panthera Uncia】

雪豹是一种大型猫科动物，原产于亚洲中部山区。为高山动物，常栖于海拔2500-5000米的高原地区。分布面积广达123万平方公里，分布范围之广，但呈斑状分布，因终年生活在雪线附近而得名。

雪豹被誉为世界上最美丽的猫科动物，其头小而圆，尾粗长，略短或等于体长，尾毛长而柔。体长110~130cm；尾长80~90cm，体重30~60kg。全身灰白色，布满黑斑。

雪豹行踪诡秘，常于夜间活动。所以专家只能粗略地根据大致的栖息地范围和每只雪豹的领地范围，据1996年统计的数字，全世界大概有3500只~7000只野生雪豹。因为它的活动路线较为固定，易捕获，加之豹骨与豹皮价格昂贵，人类不断的捕杀雪豹，使雪豹的数量急剧下降。在国际IUCN保护等级中雪豹被列为“濒危”（EN）级。

雪豹不仅是亚洲高山高原地区最具代表性的物种，也可以看作是世界高山动物区系的象征。由于雪豹生性喜欢独居，又雄踞在冰峰雪岭之上，远离尘嚣，使得美丽的雪豹更显神秘而雄奇，被雪山居民尊奉为神兽，誉为“雪山之神”。雪豹是亚洲高山生态系统中的“旗舰”物种，雪豹如遭灭绝，将意味着高山生态系统的彻底破坏甚或毁灭。

尽管阿富汗在2002年时就已经在全国范围内颁布了禁止捕杀雪豹的禁令，但是收效甚微，一些旅游者密集的集市及外国军事基地附近经常可以看到作为商品出售的雪豹皮毛。多年以来，干旱少雨、荒漠化、基础设施的破坏、现代化战争、极度的贫困再加上缺乏有效的法律管制等诸多因素使阿富汗当地的植被及动物的生存环境遭到了严重的破坏。野生雪豹如今在阿富汗已经难觅踪影了。



[ KM# 978 ] 面值：250 AFGHANIS

发行时间：1978

材质：28.5700 g., 0.9250 Silver

0.8496 oz. ASW, 38.5 mm.

\* [ KM# 978 ] 28.2800 g., 0.9250 Silver

0.8410 oz. ASW



阿富汗伊斯兰共和国  
Islamic Republic of Afghanistan





## 白鹤 Siberian Crane 【Grus leucogeranus】

白鹤是一种大型的水鸟，身长可达140厘米，重逾10公斤。它们细长而直的喙呈红色，头和脚均很修长。

白鹤是迁徙鸟和越冬鸟，在俄罗斯远东地区的萨哈共和国和西伯利亚西部进行繁殖，而这是很长距离的迁徙。其东部的族群在中国的长江中下游过冬，中部族群在印度的凯奥拉德奥国家公园（Keoladeo National Park）过冬，而西部的族群则在伊朗的Fereidoonkenar和伊斯法罕过冬。

白鹤是对栖息地要求最苛刻的鹤类，它们栖息于芦苇沼泽湿地，对浅水湿地的依恋性很强。以水生植物根、茎为食，也兼食少量的蛙、鱼、螺等。



[ KM# 980 ] 面值：500 AFGHANIS

发行时间：1978

材质：35.3000 g., 0.9250 Silver 1.0498 oz. ASW, 42 mm.

\* [ KM# 981 ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



阿富汗伊斯兰共和国  
Islamic Republic of Afghanistan





# 博茨瓦纳共和国    Republic of Botswana

国土面积：660,370平方公里（世界第44名）  
总人口：2,029,307人（世界第145名，2010年）  
首都：哈博罗内（Gaborone）  
官方语言：英语、茨瓦纳语  
货币单位：普拉（Pula）



博茨瓦纳共和国位于非洲南部内陆。该国地处南非高原中部的卡拉哈迪盆地，平均海拔约1000米左右。东接津巴布韦，西连纳米比亚，北邻赞比亚，南接南非。大部分地区属热带干旱草原气候，西部为沙漠，属热带沙漠气候。年均气温21℃。年均降水量400毫米，是世界死亡率最高的国家。

喀拉哈里沙漠覆盖了博茨瓦纳接近七成土地。位于西北方的奥卡万戈沼泽（Okavango Swamp）是世上最大的内陆三角洲。马卡迪卡迪盐沼（Makgadikgadi Pan）面积广大，盘据博茨瓦纳北方。

博茨瓦纳拥有多样的野生动植物栖息地。卡拉哈里沙漠是非洲最湿润降水最多的沙漠，也是全非洲气候最温和的沙漠，较多的降水赋予它独特的地貌特征，这里成为了非洲野生动物最多的地区；热带草原上有黑尾牛羚、亚科羚羊、其他哺乳类和雀鸟等野生动物；另外其境内的卡拉哈迪动物保护区面积达52,800平方公里，是世界第三大野生动物保护区。



# 南非剑羚 Gemsbok 【Oryx Gazella】

南非剑羚是一种原产于非洲南部的偶蹄目，是长角羚属（Oryx）现存的四个成员之一。分布于南非、纳米比亚及博茨瓦纳。它体长约150到200厘米，肩高约110到130厘米，体重约100到200公斤，是剑羚属中最大型的种类。身体上覆盖的毛是灰褐色，但脸部、腹部及四肢下部的体毛是白色。脸部中央、眼睛到嘴巴四周、咽部、前肢与后肢之间的体侧、四肢的膝部及尾巴都有黑色的毛分布。

不论是雄性或是雌性的南非剑羚都有长而直的角，其中以雄性的角较大，最长可以达到约120厘米。它们栖息于沙漠之中，以一只强大的雄性为中心，形成约10到40匹的群体共同生活。年迈的雄性会离开群体独自生活。南非剑羚为草食性动物，吃草或树叶等。

为了保护每年迁徙的南非剑羚，南非、博茨瓦纳、以及纳米比亚三个国家共同建立了非洲第一座跨国界保护公园——卡格拉格帝（Kgalagadi，博茨瓦纳语，意思是“口渴之地”）。公园在1931年开始使用。2000年5月，博茨瓦纳的剑羚国家公园（Gemsbok National Park）以及南非的卡格拉格帝剑羚国家公园（Kgalagadi Gemsbok National Park）正式合并为跨国界保护区。这个保护区的建立不但可以帮助剑羚因着季节的变化而自由地迁徙，也让他们的掠食者亦有相同迁徙的机会。这实现了动物生态自由且自然的消长。




[ KM# 11 ] 面值：5 PULA  
发行时间：1978  
材质：28.5000 g., 0.5000 Silver 0.4581 oz. ASW  
\* [ KM# 11a ] 28.5000 g., 0.9250 Silver 0.8475 oz. ASW



博茨瓦纳共和国  
Republic of Botswana





# 山羚 Klipspringer 【 Oreotragus Oreotragus 】

山羚，其名字来自荷兰语，意为“山岩的跳跃者”。生活在非洲东部和南部。山羚肩高只有58厘米，是相对于其他羚羊来说是体型较少的动物。只有雄性有脆弱的角，一般长20-25厘米。它们以蹄尖站立。

山羚的毛皮厚而密，有着橄榄形状的小斑点，几乎无尾。这样的毛皮能使它们生活在石间而难让人发现。它们以钝而圆的蹄尖站立，以踩高跷般、蹦蹦跳跳的姿态奔跑。山羚跳跃敏捷，能像岩羚羊那样迅速在岩石间飞驰。

山羚是草食性动物，以石间植物为粮食。它们不用喝水，这是由于多汁的植物提供了它们生存所需的水份。



[ KM# 12 ] 面值：10 PULA  
发行时间：1978

材质：35.0000 g., 0.5000 Silver 0.5626 oz. ASW

\* [ KM# 12a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



博茨瓦纳共和国  
Republic of Botswana





# 哥伦比亚共和国 Republic of Colombia

国土面积：1,138,910平方公里（世界第25名）  
总人口：45,600,000人（世界第28名，2005年）  
首都：波哥大（Bogotá）  
官方语言：西班牙语  
货币单位：哥伦比亚比索（Colombian Peso）



哥伦比亚位于南美洲西北部，位于南美洲西北部，东邻委内瑞拉、巴西，南接厄瓜多尔、秘鲁，西北角与巴拿马接壤，北临加勒比海，西濒太平洋。

哥伦比亚境内显著地分为西部山地区和东部平原区，安第斯山脉在哥伦比亚境内分成西、中、东三条南北走向的平行山脉，山脉间有宽大的山间谷地；东部为亚马逊河和奥里诺科河支流形成的冲积平原。哥伦比亚地处热带地区，气候因地势而异。东部平原南部和太平洋沿岸属热带雨林气候，一千至二千米的山地属亚热带森林气候，西北部属热带草原气候。

哥伦比亚境内拥有丰富的物种，其生物多样性占世界的13.5%，列全球第四位。位于西北部的洛斯卡蒂奥斯国家公园（Los Katios National Park）占地72,000平方公里，包括许多低矮的丘陵、森林和沼泽地。在这里发现了许多罕见的物种，公园已经成为大部分濒临灭绝动物和特有植物的家园。1994年这里被列入《世界遗产目录》。





# 奥利诺科鳄 Orinoco Crocodile 【Crocodylus Intermedius】



Critically Endangered  
★ 极危 ★  
International Union for Conservation of Nature  
International Union for Conservation of Nature

奥利诺科鳄是一种淡水鳄鱼，主要分布于南美洲北部的淡水地域（尤其是于奥利诺科河 El río Orinoco），与美洲鳄分享共同的栖息地。主要以鱼为食，也捕食其他可以捕到的脊椎动物。

奥利诺科鳄也是南美洲体型最大的鳄鱼品种，一般成年奥利诺科鳄身长可达4.8米，雌性体重可达200公斤，雄性则有380公斤。而目前以其数量来说，要找到长5米以上的奥利诺科鳄，机率可说是微乎其微。

为了得到制作手提包，皮带和鞋子的鳄鱼皮，南美洲的奥利诺科鳄十年来遭到无情地猎杀。到20世纪60年代中期为止，它们已经几乎灭绝。直到1976年，猎杀才被禁止。



[ KM# 264 ] 面值：500 PESOS

发行时间：1978

材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



哥伦比亚共和国  
Republic of Colombia



# 栗腹蜂鸟 Chestnut-Bellied Hummingbird [ Amazilia Castaneiventris ]



Endangered Endangered Endangered Endangered  
★ 濒危 ★  
International Union for Conservation of Nature International Union for Conservation of Nature

栗腹蜂鸟仅分布在哥伦比亚的山地森林和热带高海拔灌丛中，是哥伦比亚特有的物种。它的头和颈部的羽毛呈现出闪亮的绿色，腹部呈棕栗色，尾部则是鲜红色。平均体长8.4厘米。以各种花蜜为食。  
在现代社会中，随着森林的砍伐、耕作的发展，蜂鸟赖以生存的栖息地逐渐被破坏，栗腹蜂鸟也濒临灭绝。



[ KM# 265 ] 面值：1000 PESOS  
发行时间：1978  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



哥伦比亚共和国  
Republic of Colombia





哥斯达黎加共和国 Republic of Costa Rica

国土面积：51,100平方公里（世界第126名）  
总人口：4,327,000人（世界第119名，2005年）  
首都：圣何塞（San José）  
官方语言：西班牙语  
货币单位：哥斯达黎加科朗（Costa Rican Colón）



哥斯达黎加位于中美洲的狭长地带，北纬10度，西经84度。东临加勒比海，西靠北太平洋，有着1290千米的海岸线（东岸加勒比海212千米，西岸太平洋1016千米）。哥斯达黎加北部与尼加拉瓜接壤，东南偏南与巴拿马接壤。

哥斯达黎加的东西两侧海岸为平原，而中部被崎岖的高山所隔绝。气候属于热带和亚热带，还有一部分是新热带。

哥斯达黎加拥有多样的动植物。由于哥斯达黎加是世界上第一个不设军队的国家，人们因此戏称：在这里“食叶之蚁代替陆军，金刚鹦鹉代替空军，而鲸则取代了舰艇。”40%的哥斯达黎加领土覆盖著原始森林，是野生动物的乐园。







★ 濒危 ★

International Union for Conservation of Nature

## 绿海龟 Green Sea Turtles 【Chelonia Mydas】

绿海龟是海洋中的爬行类动物，是海龟属下的唯一一种。其一生中大多数的时间都在海中生活，但演化过程中仍然保留了部分祖先的生活方式，所以必须回到陆地上产卵，繁育后代，形成了一种较独特的生活习性。

绿海龟广泛分布在热带及亚热带海域中，即约南北纬度20°C等温线之间的海域，并在水温逾摄氏25度的沙滩上产卵。由于用肺呼吸，它在海中的潜水深度极限约为一、两百米。绿海龟的主食为海中的海草与大型海藻，因此体内脂肪累积了许多绿色色素，呈现淡绿色，也因而得名。

绿海龟的成龟因体型硕大、背及腹甲坚硬且游泳速度迅速，因此除了人类之外，几乎没有什么主要的天敌。因人类的捕杀及栖地之破坏，绿海龟已濒临绝种，全世界只剩下约20万头产卵母龟。



[ KM# 200 ] 面值：50 COLONES

发行时间：1974

材质：25.5500 g., 0.5000 Silver 0.4107 oz. ASW

\* [ KM# 200a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



哥斯达黎加共和国  
Republic of Costa Rica



# 西印度海牛 West Indian Manatee 【Trichechus Manatus】


西印度海牛是在海洋哺乳动物中是相当特殊的动物，因为它们可以自由往来于淡水与海水之间。西印度海牛终年栖息于北美洲东南部海岸、河口与美国佛罗里达州的主要河流。在温暖的月份里，它们的分布往北可达罗德岛（Rhode Island）；冬季来临时，它们集中于佛罗里达一带，寻找温暖水域或可避开寒冷海流的地方。它们对栖息地的选择倾向于水草茂盛的河流，或是平静、水草多而近河口的海域。

与其他海牛相同，西印度海牛有流线形的身躯，背脊宽阔而无背鳍。长3-6米；头小；前肢呈鳍状，具有残留的指甲状构造，后肢退化，尾部圆形。

由于西印度海牛的肉、脂肪与骨骼在多种民俗疗法上使用，加之它们的肋骨在质地上与象牙相似，也被非法雕刻当作珠宝贩卖。同时受到日渐增加的海岸开发威胁，西印度海牛族群相当脆弱。



[ KM# 201 ] 面值：100 COLONES  
发行时间：1974  
材质：32.1000 g., 0.5000 Silver 0.5160 oz. ASW  
\* [ KM# 200a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



哥斯达黎加共和国  
Republic of Costa Rica





埃塞俄比亚联邦民主共和国  
Federal Democratic Republic of Ethiopia

国土面积：1,104,300平方公里（世界第26名）  
总人口：88,013,491（世界第13名，2011年）  
首都：亚的斯亚贝巴（Addis Ababa）  
官方语言：阿姆哈拉语  
货币单位：埃塞俄比亚比尔（Ethiopian Birr）



埃塞俄比亚位于“非洲之角”的中心，是内陆国。东与吉布提、索马里毗邻，西北和苏丹交界，北接厄立特里亚，南和肯尼亚接壤。境内多高原，占全国面积的2/3；低地沙漠占全国面积1/4左右。全国平均海拔2,500-3,000米，有“非洲屋脊”之称。境内多湖泊、河流，水利资源丰富，又有“东北非水塔”之称。

由于纬度跨度和海拔高度差距较大，虽地处热带，但是各地温度冷热不均。每年6-9月为大雨季，10-1月为旱季，2-5月为小雨季。由于不同季节和地区降雨不均，易出现局部干旱。

跨度巨大的海拔高度使得埃塞俄比亚拥有多样化的自然生态环境。这里的沙漠、森林、草原和山地成为了众多稀有动植物的家。埃塞俄比亚已经规划了几个国家公园和自然保护区，并且正在实施一些保护措施。其中瑟门山国家公园（Simien Mountains National Park）覆盖了面积为179平方公里的高地，平均海拔为3,300米。在这里居住着巨角塔尔羊、瑟门狐和狮尾狒狒等等埃塞俄比亚地区所特有的动物。







# 胡兀鹫 Bearded Vulture 【Gypaetus Barbatus】

胡兀鹫，也被称为髯鹫。是一种体型巨大的鸟，它凭借展开两米宽的双翼，在山间的上升气流中翱翔。胡兀鹫虽然身材巨大，却不急于抢食。它们耐心地等候，让其它动物先做处理，一直等到大餐几乎被享用完，它们才开始行动。胡兀鹫名字的意思是“羊羔捕食者”，不过这些令人生畏的鸟对肉并不感兴趣，它们嗜食的是骨头。重量相当于它们自身体重的骨头很轻松就可以被它们拖起来，再摔到地上——摔碎的骨头露出了营养丰富的骨髓。将骨头摔碎需要技巧，胡兀鹫需要练习整整七年才能完全掌握这种技巧。在非洲大多数的山上都有胡兀鹫定居，只要那里有足够的食物，也有足够大的风托起它们巨大的身躯。对于胡兀鹫来说，在埃塞俄比亚这里，生活条件非常完美。

[ KM# 61 ] 面值：10 BIRR  
发行时间：EE1970 (1977-78)

材质：25.3100 g., 0.9250 Silver 0.7527 oz. ASW

\* [ KM# 61a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



埃塞俄比亚联邦民主共和国  
Federal Democratic Republic of Ethiopia



# 山薮羚 Mountain Nyala [ Tragelaphus Buxtoni ]

山薮羚，又名山地羚，是埃塞俄比亚的一种羚羊。它们生活在埃塞俄比亚中部高海拔的林地。山薮羚肩高1米及重150-300公斤，公羚比雌羚明显大很多。它们呈灰褐色，有些隐约可见白色的斑纹，其毛色会随年龄变深，腹部较为浅色。公羚的角扭曲1-2转，角长少于1米。

山薮羚是东非大裂谷东南方埃塞俄比亚高原的特有种，生活在北纬6-10°。它们以往曾分布在Gara Muleta山，东至Shashamene及南至巴莱地区南部；现时它们主要分布在贝尔山国家公园。它们栖息在海拔2000米以上的林地、石楠地及丛林，有时更会走到海拔4000米以上。它们主要吃香草及灌木。它们是以4-6只群居的，有时可以多达13只以上，成员为雌羚及幼羚，并一头老公羚。

目前，野外仅有约2500头山薮羚，其威胁主要是来自侵占它们栖息地的人类。



[ KM# 62 ] 面值：25 BIRR  
发行时间：EE1970 (1977-78)  
材质：31.6500 g., 0.9250 Silver 0.9412 oz. ASW  
\* [ KM# 62a ]35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



埃塞俄比亚联邦民主共和国  
Federal Democratic Republic of Ethiopia





# 斐济群岛共和国 Republic of Fiji

国土面积：18,274平方公里（世界第152名）  
总人口：905,949人（世界第154名，2006年）  
首都：苏瓦（Suva）  
官方语言：英语、斐济语、印度斯坦语  
货币单位：斐济元（Fijian Dollar）



斐济位于南纬15度到22度，东经174度和西经177度之间方圆71万平方公里的南太平洋中心地带，180度国际日期变更线穿过该群岛。全国由322个岛屿组成，陆地面积为18,272平方公里。大多数岛屿都是山区，亦有少数环礁珊瑚岛。维提岛是斐济第一大岛，面积为10,390平方公里，占全国陆地面积的50%以上，也是斐济群岛中经济最为发达和人口集中的地方。

斐济属热带海洋性气候。每年5 - 12月，斐济受寒冷的东南信风的影响，温度较低，平均气温为摄氏22度，也是全年最干旱的时期。12月 - 4月，气温较高，平均温度为摄氏32度，风向多变，且降雨较多。由于斐济位于热带风暴地区，每年11月~4月间，斐济会受到风暴的袭击，平均每十年有10~12次风暴袭击斐济部分地区，2~3次非常严重。山脉把维提岛划成干旱区和潮湿区。斐济自然条件适于鸟类生长，但野生动物较为稀少大多数岛屿的东南部或者迎风的一面气候潮湿，植物茂盛，背风的一面则比较干燥，较为贫瘠。





# 黑脸鹦雀 Pink-billed Parrotfinch [ *Erythrura kleinschmidtii* ]



黑脸鹦雀是斐济维提岛（Viti Levu，斐济第一大岛）上的一种梅花雀（Estrildidae）。主要分布于维提岛中部和东部地区的无人成熟林中。

黑脸鹦雀主要以昆虫为食，同时也吃一些花蕾和植物果实。成鸟大约体长约11厘米，有一个比其他梅花雀类捕食略大的粉色的喙，身上主要是橄榄绿色的羽毛，脸部呈黑色。




[ KM# 41 ] 面值：10 DOLLARS

发行时间：1978

材质：28.2800 g., 0.5000 Silver 0.4546 oz. ASW

\* [ KM# 41a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



斐济群岛共和国  
Republic of Fiji



# 黄金宝螺 Golden Cowrie 【Cypraea Aurantium】



黄金宝螺是一种腹足钢宝螺科的软体动物。它的着美丽贝壳，可以作为货币和宗教的象征。在斐济岛上，酋长们戴着黄金宝螺贝壳的项链，来表示他们地位和等级。

黄金宝螺事实上是一种海生蜗牛，因其明亮的贝壳而命名，它是人们所周知的、世界上250种最大的宝螺物种之一，长达10厘米。黄金宝螺带有平底型基础和有狭小通道的蛋形结构。与其他的宝螺相类似，它们的外壳非常光滑，光泽而优美。它们在移动时，会用外套膜伸展将贝壳包被起来，从而保护其光泽的表面。

这些软体动物平时很难被发现，它们大多在南太平洋的岩石裂缝中度过其大部分的时间。只有在夜间，它们才会出来吃些海绵和藻类。如今黄金宝螺的贝壳极难被发现，因此它们也为收藏家所推崇。不幸的是，由于失去了栖息地和人们对它们的过度捕捞，使这种野生种群的数量处于困境。



[ KM# 42 ] 面值：20 DOLLARS  
发行时间：1978  
材质：35.0000 g., 0.5000 Silver 0.5626 oz. ASW  
\* [ KM# 41a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



斐济群岛共和国  
Republic of Fiji





# 福克兰群岛 Falkland Islands

\* 英国、阿根廷争议地区

国土面积：12,173平方公里

总人口：3,060人（2005年）

首都：斯坦利港（Stanley）


官方语言：英语

货币单位：福克兰群岛镑（Falkland Islands Pound）



福克兰群岛（英语：Falkland Islands，为英国所使用的称呼）或马尔维纳斯群岛（西班牙语：Islas Malvinas，是声称拥有其主权的阿根廷所使用之称呼），位于南大西洋，包含2个主岛：东福克兰岛和西福克兰岛以及周围778座小岛，其中长年有人居住的有15个岛屿。首府为斯坦利港（阿根廷方面称其为“阿根廷港”）。两主要岛屿的北部都有东西走向的山脉，沿岸许多溺河谷形成有屏障的海港。阴凉多风的气候使这里温度平稳，仅有季节性的小变动，年平均温度约5℃。

岛上植物低矮、浓密，分布在无天然树木生长的草原上，以白草（Cortaderia pilosa）和岩高兰（Empetrum rubrum）为主。由于寒冷湿润的气候抑制了草木质的完全腐烂，从而堆积了深厚的泥煤层，当地人就用这些泥煤作燃料。





# 座头鲸 Humpback Whale 【Megaptera Novaeangliae】

座头鲸，又名大翅鲸、驼背鲸、巨臂鲸，属于须鲸亚目的海洋哺乳动物。其“座头”之名源于日文“座头”，意为“琵琶”，指鲸鱼背部的形状。该物种为大型鲸鱼：成年鲸身长可达12至16米之间，目前最大记录的雌性可达18米。体重25至35吨。座头鲸以其跃出水面姿势、超长的前翅与复杂的叫声而闻名。座头鲸可由他们带有明显驼峰的厚实身躯，以及黝黑的上半部而轻易辨认。头部与下顎布满称为节瘤的小瘤，这些小瘤其实是毛囊，也是此物种的特色。尾部尾鳍具有波浪状耸起边缘，于潜水过程中会往上举起。

座头鲸在所有主要海洋中均有发现，它们分布在从南极冰缘到北纬65度的广阔海面。这是一个有迁移特点的物种，它们夏天生活在凉爽的高纬度水域，但是在热带或亚热带水域交配繁衍。

在十九世纪中以前，全球座头鲸的数量曾达到150,000条，但在往后的一个世纪里，人类大规模的商业捕鲸活动令其数量锐减。1986年国际捕鲸委员会通过了《全球禁止捕鲸公约》，严格禁止所有商业捕鲸活动，才令座头鲸免于当时绝种。



[ KM# 11 ] 面值：5 POUNDS  
发行时间：1979  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



福克兰群岛  
Falkland Islands



# 短翅船鸭 Falkland Steamer Duck 【Tachyeres Brachypterus】



短翅船鸭是属于鸭科的一种群居型水鸭。是陆栖性较强的类群，适应潜水，基本已经失去了飞行能力，而是用翅膀来帮助潜水。它们在水面上浮游时，圆翅膀滑水时酷似船的桨一样摆动，故名“船鸭”。雄鸭有白色的头颈，上面杂少许褐色和棕色的羽毛。鸭喙和腿黄色，上体、胸部和翅膀是深浅不一的黑褐色，有浅色斑点，腹部至臀部白色，虹膜黑色，白眼圈，白眼纹，翅膀上有白色翼镜。雌鸭不同处是鸭喙黑色。

短翅船鸭分布于南美洲，大多都栖息于福克兰群岛的海岸线附近。它们主要以甲壳动物、软体动物、虾和小鱼等动物性食物为食。

[ KM# 12 ] 面值：10 POUNDS

发行时间：1979

材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



福克兰群岛  
Falkland Islands



# 冈比亚共和国 Republic of The Gambia

国土面积：10,380平方公里（世界第161名）  
总人口：1,517,000人（世界第146名，2005年）  
首都：班珠尔（Banjul）  
官方语言：英语  
货币单位：达拉西（Dalasi）



冈比亚共和国是一个西非国家，陆上被塞内加尔环绕，是非洲大陆上最小的国家。冈比亚河贯通国家中央，流往大西洋。全境为一狭长平原，一年分为雨季和干季，7、8、9月为雨季其余月份为旱季，旱季炎热而干燥，雨季闷热而潮湿，降雨频繁且多伴有雷电。地下水资源清洁丰富。地下水位较高，距地表仅10米左右。

冈比亚有六个国家公园和保护区，与其它的一些森林公园一起，占国家面积的3.7%。国家公园和保护区由公园和野生动物管理部门管辖，这些保护区被留出以保护主要栖息动物的代表性品种及它们的相关联动物群。





## 距翅雁 Spur-winged Goose [ *Plectropterus Gambensis* ]

距翅雁，又名直翅鹅，是一种分布在撒哈拉以南非洲湿地的鸭科动物。距翅雁长75-115厘米，平均重4-6.8公斤，有时可以达10公斤，雄鸟较雌鸟大。它们是非洲最大的水鸟，也是世界上平均体型最大的鹅。

这种由黑白两色羽毛组成的飞雁很容易识别，它们具有长而粗的脖子，宽大的翅膀和细长的腿。雌雄类似，但雄性体型更大一些。成雁有一顶鸭舌帽，脖子以下（前颈除外）、胸部两侧、几乎整个下半身（包括飞行翼和尾部）都是泛青铜光泽的黑金属绿色。

距翅雁成群栖息于湖泊，池塘，河流，三角洲和沼泽草甸。一般优先选择大江大河，大型湖泊。在东非虽然可以达到在海拔3000米的高度，但尽量避免出现于盐湖和山区。一般群居，生活于50个左右的小群，尤其在繁殖后换毛期间聚群。游泳能力很强，通常喜欢站在岸边，或停息在河流和湖泊，甚至海岸边的树木上。在旱季或雨季进行季节性的迁移。往返于进食地点和栖息地之间，通常在晨昏进食，不过在月色下可能也在夜间进食。食物主要是素食，包括植物的种子，果实，块茎，水生植物和芦苇，也吃小鱼和无脊椎动物。



[ KM# 17 ] 面值：20 DALASIS

发行时间：1977

材质：28.6300 g., 0.9250 Silver 0.8514 oz. ASW



冈比亚共和国  
Republic of The Gambia



# 土豚 Aardvark 【Orycteropus Afer】

土豚是非洲特有的动物，也是管齿目 (Tubulidentata) 现存唯一的一种。体型类似袋鼠，但颇肥壮。体长90~140厘米，体重50~60千克；皮厚，红褐色或白色；头部窄而长，吻部前突呈管状；舌细长，富粘液，能延伸；耳长大而薄，类似驴耳；四肢粗强，趾端具强大而锐利的爪；尾呈圆柱形，尾肌很发达，基部粗，末端变细，长约48~60厘米。分布于撒哈拉沙漠以南的东非至南非。

土豚是一种稀少的奇特动物，特别是牙齿与众不同，成体时上下颌仅可见2对前臼齿和3对臼齿，无门齿和犬齿。牙齿终生生长，齿的内部全为齿质。

土豚栖息在丘陵和半草原地区。独自生活在较深的洞穴中。极善于挖土，掘进速度快，几分钟内就能遁入土中，它打洞的速度超过10名使用镐锄的成年人。它们在夜间活动，以利爪抓破蚁丘，用长舌粘白蚁充食。土豚的饭量很大，一夜可以吃掉50000只白蚁。但土豚性懦弱胆小，缺乏自卫能力，全靠灵敏的听觉察知外部敌情，尽早地隐匿或逃入洞内。如今栖息地的破坏以及过度放牧已经威胁到了这一非洲特有物种的生存。



[ KM# 18 ] 面值：40 DALASIS  
发行时间：1977

材质：35.2900 g, 0.9250 Silver 1.0495 oz. ASW



冈比亚共和国  
Republic of The Gambia





## 印度尼西亚共和国 Republic of Indonesia

国土面积：1,919,440平方公里（世界第16名）

总人口：234,693,997人（世界第4名，2007年）

首都：雅加达（Jakarta）

官方语言：印尼语

货币单位：印尼盾（Indonesian Rupiah）



印度尼西亚位于东南亚，由上万个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，因此有“千岛之国”之称。印尼群岛分布于北纬6度、南纬11度，东经95度至141度之间，赤道贯穿全境，其70%以上领地位于南半球，因此是亚洲唯一一个南半球国家。其国土东西达5,300公里，南北约2,100公里，成为亚洲大陆和澳大利亚之间的桥梁。同时这里也是太平洋印度洋间的要冲，在全球战略上居重要地位。

由于印度尼西亚处在环太平洋地震带中，是一个多地震的国家，且火山活动频繁。全国400余座火山分布在除加里曼丹外各岛，其中100座为活火山，是世界上火山活动最多的国家之一。印度尼西亚是典型的热带雨林气候，年平均温度25 - 27°C，无四季分别。北部受北半球季风影响，7、8、9 三个月降水量丰富，南部受南半球季风影响，十二月、一月、二月降水量丰富。但如今，受人类生活的影响，印度尼西亚已经成为世界上森林消失速度最快的国家。





# 爪哇虎 Javan Tiger 【Panthera Tigris Sondaica】

爪哇虎是一种曾生活在印度尼西亚爪哇岛上的虎，一般认为这种老虎已经绝迹。虽然迄今还不时有目击的传闻，但都未获得证实。

爪哇虎体长约200~350cm，鼻骨比较长，鼻头一般是粉色的，有时还带有黑点。它们的耳朵很短，形状如半圆，耳背是黑色的，中间也有个明显的大白斑。虎的四肢强壮有力，前肢比后肢更为强健。它们的尾巴又粗又长，并有黑色环纹环绕，尾尖通常是黑色的。


爪哇虎的外表同近亲苏门答腊虎相似，毛很短，纹路很细，经常两条纹路变成一束。但身上的黑色条纹较密。爪哇虎面部的胡须也是虎的九个已知亚种里最长的。

爪哇虎分布在爪哇岛的南部山地丛林中，其视觉、听觉和嗅觉都很棒，它们对气候条件不挑剔，只要有隐身处、水和猎物就可以了，并不像豹子那样过分依赖森林。20世纪初爪哇岛上仍生存着近万只的爪哇虎。1945年印尼宣布独立，定都雅加达，爪哇岛上的人口猛增，使需要很大活动范围的爪哇虎无处生息，数量随之一天天地减少。

20世纪60年代后，爪哇岛上的爪哇虎已经所剩无几，而人工饲养下的爪哇虎这时还没有繁殖成功。1980年，最后一只爪哇虎在雅加达的动物园去世了，这是印尼继1937年巴厘虎灭绝之后又一个虎种的绝迹。



[ KM# 39 ] 面值：2000 RUPIAH  
发行时间：1974  
材质：25.6500 g., 0.5000 Silver 0.4123 oz. ASW



印度尼西亚共和国  
Republic of Indonesia





# 婆罗洲猩猩 Bornean Orangutan [ Pongo Pygmaeus ]

婆罗洲猩猩是原居于印度尼西亚婆罗洲的猩猩。它们与体型较小的苏门达腊猩猩是亚洲仅有的两种类人猿。婆罗洲猩猩生活在婆罗洲低地及海拔1500米高山的热带雨林中。它们栖息在树上，并会随食物而去到很远的地方。它们主要吃生果、树枝、树皮、丰富矿物质的土壤及鸟蛋。它们亦会吃昆虫，但是只属少数。婆罗洲猩猩较苏门达腊猩猩花更多时间在陆地上，因为它们不用逃避苏门答腊虎等巨大掠食者。

婆罗洲猩猩较苏门达腊猩猩普遍，现存约有45000头。它们由于失去栖息地及作为丛林肉被买卖，数量开始减少及濒危。幼猩猩亦会被捕捉为宠物，而其母亲往往会被杀。



[ KM# 39 ]  
面值：5000 RUPIAH  
发行时间：1974  
材质：32.0000 g., 0.5000  
Silver 0.5144 oz. ASW



印度尼西亚共和国  
Republic of Indonesia





# 约旦哈希姆王国 Hashemite Kingdom of Jordan

国土面积：92,300平方公里（世界第110名）  
总人口：6,407,085人（世界第102名，2010年）  
首都：安曼（Amman）  
官方语言：阿拉伯语  
货币单位：约旦第纳尔（Jordanian Dinar）



约旦哈希姆王国位于亚洲西部，阿拉伯半岛的西北，西与巴勒斯坦、以色列为邻，北与叙利亚接壤，东北与伊拉克交界，东南和南部与沙特阿拉伯相连。基本上是个内陆国家，亚喀巴湾是唯一出海口。

约旦整体地势呈西高东低走势。西部多山地，东部和东南部为沙漠。沙漠占全国面积80%以上。约旦河流经西部注入死海。死海是咸水湖，湖面低于海平面392米，为世界陆地最低点。西部山区属亚热带地中海型气候。全国可耕地只占全国面积的4%。在亚喀巴湾约旦有一小段海岸线。大部分地区属亚热带沙漠气候，西部山地属地中海气候；年降水量100 - 700毫米。





# 细角瞪羚 Rhim Gazelle 【Gazella leptoceros】



Endangered  
Endangered  
Endangered  
Endangered  
Endangered  
★ 濒危 ★  
International Union for Conservation of Nature

细角瞪羚是瞪羚的一种，主要生活在沙漠地区。由于撒哈拉沙漠的中午非常热，细角瞪羚便主要在早晨、傍晚和夜晚活动。不需要喝水，其水分来自于树叶和草。细角瞪羚是流浪性动物，没有固定的栖息地，但细角瞪羚并不迁徙。



[ KM# 31 ] 面值：2-1/2 DINARS  
发行时间：AH1397-1977  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW, 38.61 mm.



约旦哈希姆王国  
Hashemite Kingdom of Jordan



# 巴勒斯坦太阳鸟 Palestine Sunbird 【Cinnyris oseus】



太阳鸟属雀形目，太阳鸟科，外表和习性都有点像蜂鸟。嘴细长而下弯，嘴缘先端具细小的锯齿；舌呈管状，尖端分叉；尾呈楔形。

巴勒斯坦太阳鸟栖息在干燥炎热的林地、草原等地，在某些地区的城镇中也能见到它们的身影。这个太阳鸟的亚种通常体长8 - 12厘米。雄性的羽毛中会呈现出光亮的蓝色或绿色。它们的速度非常快，叫声也很有特色。巴勒斯坦太阳鸟主要吃昆虫及花蜜。它们的舌头很长，可以从花瓣中吮吸露水。

[ KM# 32 ] 面值：3 DINARS  
发行时间：AH1397-1977  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW,  
42 mm.



约旦哈希姆王国  
Hashemite Kingdom of Jordan





# 马拉维共和国 Republic of Malawi

国土面积：118,480平方千米（世界第98名）  
总人口：14,901,000人（世界第64名，2010年）  
首都：利隆圭（Lilongwe）  
官方语言：齐切瓦语、英语  
货币单位：马拉维克瓦查（Malawian Kwacha）



马拉维是一个位于非洲东南部的内陆国家，邻接赞比亚、莫桑比克及坦桑尼亚。南北有东非大裂谷贯穿，谷底就是马拉维湖，是非洲第三大湖，占马拉维总面积的20%。1984年马拉维湖被列入世界自然遗产。希雷河出自马拉维湖南端，流经马拉维南部地区，最后注入400千米以南的赞比西河。裂谷的东西面为海拔达900-1200米的高原。北部地区的尼卡高原高达2600米。南部的希雷高地平均海拔600 - 1600米，不过也有松巴高原高2130米，和木兰吉山达3050米。希雷河下游地势较低，海拔只有60 - 90米。

马拉维大部份地区的气候垂直差异显著，为热带干湿季气候区的高地气候，普遍来说高山平原的气温十分温和稳定，但冬天的气温可以低至摄氏4度。而盆地的气温较为闷热，最热的时候可以摄氏39度，而每年的降雨量也因地理环境而有所差别，平均由600mm至3000mm不等。







# 斑马 Zebra [ Hippotigris ]

斑马是斑马亚属（Hippotigris）和细纹斑马亚属（Dolichohippus）的通称，是一类常见于非洲的马科动物。斑马身上有许多的条纹，每只的条纹都不一样。一般来说斑马是社会性动物，习惯群体生活；规模较小的群体由一只雄性斑马及若干只雌性组成，较大的则由几百只斑马组成。斑马不太擅长奔跑，没有固定的栖居地，过着迁徙性的生活。成年斑马一般约2.3米高，肩高约1.5米，体重为300到400公斤，最重的超过410公斤。除了斑纹之外，斑马还有立起的鬃毛。斑马跟其近亲马、驴不同，还未真正被人类驯养。虽然以前斑马被误以为白色皮肤、黑色间条，但其实斑马是黑色皮肤、黑毛与白毛相间的动物。

现存的斑马种类有三种，分别为平原斑马、细纹斑马及山斑马。平原斑马跟山斑马都属于斑马亚属的动物，细纹斑马则为细纹斑马亚属的动物。细纹斑马与驴属有点类似；而平原斑马及山斑马则比较像马。由于猎杀及对栖息地的破坏等人为因素，斑马的数量受到了很大的影响。细纹斑马及山斑马经已经被列为濒危动物，只有平原斑马还拥有健康的种群数目。



[ KM# 15 ] 面值：5 KWACHA  
发行时间：1978  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



马拉维共和国  
Republic of Malawi



# 黑马羚 Sable Antelope 【Hippotragus Niger】

- 黑马羚是生活在东非大草原的肯尼亚和南非的一种羚羊。包括三个亚种：
- 指名亚种(H. n. niger)：低危；
  - 大黑马羚 (H. n. varani)：分布在安哥拉中部，极危种群；
  - 赞比亚黑马羚(H. n. kirkii)：分布在安哥拉中部和赞比亚西部，易危种群。

成年黑马羚通常肩高120-140厘米，体重200-270千克，雄性体型大于雌性。雌性黑马羚的体色为栗色或深褐色，雄性则为黑色。腹部、面颊部为白色，颈后长有粗鬃毛。黑马羚的角向后方弯曲，雌性角长可达1米，雄性更长，可达1.5米。

黑马羚一般生活在大草原的林地中，以中等长度的草和树叶为食。白天活动，但天热的时候活动能力有所下降。通常由一头雄性黑马羚率领，一个种群的数量一般为10-30头，包括雌性和幼仔。雄性黑马羚通过打斗来争夺交配权。



[ KM# 16 ] 面值：10 KWACHA  
发行时间：1978  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



马拉维共和国  
Republic of Malawi





# 马来西亚 Malaysia

国土面积：329,845平方公里（世界第66名）  
总人口：27,565,821 人（世界第43名，2010年）  
首都：吉隆坡（Kuala Lumpur）  
官方语言：马来文  
货币单位：林吉特（Ringgit）



马来西亚是东南亚的国家之一。马来西亚共分为两大部分，之间有南中国海相隔：一个是位于马来半岛的西马来西亚，北接泰国，南部隔着柔佛海峡，以新柔长堤和第二通道与新加坡接壤；另一个是东马来西亚，位于婆罗洲岛上的北部，南邻印度尼西亚的加里曼丹。由于马来西亚的地理位置很接近赤道，故马来西亚的气候属于亚洲热带型雨林气候。

马来西亚大部分的沿海地区都是平原，中部则是布满茂密热带雨林的高原。西马约占全国陆地面积40%，从北到南延伸740公里，最宽的部份是322公里。东西海岸地区是由蒂迪旺沙山脉所区隔，这是属于半岛中心地带的一系列山脉的一部份。这座山脉是西马某些河流的源头。围绕西马的海岸平原最宽达50千米，半岛的海岸线长度将近1,931公里，但只有在西海岸才有港口。

东马位于婆罗洲，具有长达2,607公里公里的海岸线。区分为海岸区域、丘陵与河谷，以及内陆山区。克罗克山脉由砂拉越向北延伸，穿过沙巴中央，将它分成东西两边。京那巴鲁山位于这座山脉。京那巴鲁山海拔4095.2米，是马来西亚最高的山峰，由京那巴鲁国家公园所保护，这是联合国教育、科学及文化组织指定的世界遗产。这些山脉的最高一层构成了马来西亚与印度尼西亚的疆界。砂拉越具有姆禄洞穴，这是世界最大的洞穴群。





# 马来野牛 Malayan Gaur 【 Bos Gaurus Hubbacki 】



马来野牛是印度野牛的一个亚种，分布于泰国和马来西亚地区。它的体型巨大，体长200厘米，尾长70—105厘米，体重1500千克，肩高190-220厘米，是现生牛类中体形最大的一种。体毛大都是棕褐色、黑色，鼻子和嘴唇呈灰白色，四肢膝盖以下的毛白色，故又名“白袜子”。雄兽和雌兽均有角，但雌兽的较小。雄兽的双角弯度很大，由额骨高起的棱上长出，先垂直上升，再向外弯，复又向上，最后角尖又向内并略向后弯转，长度可达60—75厘米。

马来野牛一般在晨昏活动。夏季在海拔高的山上，冬季则逐渐下降。喜群居，通常每群10-30头，以雌兽、幼仔和亚成体组成，其中有一只体型较大的雌兽为首领。成年雄兽在一年的大部分时间里是独自栖息，在交配期间才和雌兽接触。性情凶猛。以草、树叶、嫩枝、竹笋和树皮等为食，也常舔食盐碱。听觉和嗅觉灵敏。成年的自然天敌只有孟加拉虎。

[ KM# 19 ] 面值：15 RINGGIT  
发行时间：1976

材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



马来西亚  
Malaysia



# 马来犀鸟 Rhinoceros Hornbill [ Buceros Rhinoceros ]

马来犀鸟是一种犀鸟，它们分布在马来半岛、星加坡、苏门塔腊、爪哇岛及婆罗洲，栖息在雨林的最高处。成鸟长110-127cm，重2-3kg，其寿命可以达35岁。

雄马来犀鸟的眼睛呈橙色或红色，雌鸟的眼睛则是白色的。它们的喙及盔主要是白色及橙色的，下身及尾巴呈白色。

马来犀鸟十分重视示爱过程，雄鸟必须先得到雌鸟的信任才会交配、生蛋、孵蛋及育幼。它们会将鸟蛋藏在树干内，雌鸟会一同留在内，而雄鸟则会觅食。雌鸟生蛋后，雄鸟会搜集泥土，双亲一同用泥、食物及粪便封起树穴的入口。它们只会留有非常细小的洞让雄鸟喂食。当雏鸟长大后，雌鸟及雄鸟会啄开干泥，让幼鸟出来。它们主要吃果实、昆虫、细小的蜥蜴、蛇、啮齿目及较细小的鸟类。

对于达雅族而言，马来犀鸟是他们的战神。它们也是马来西亚砂拉越的州鸟。




[ KM# 20 ] 面值：25 RINGGIT  
发行时间：1976  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



马来西亚  
Malaysia





# 毛里求斯共和国 Republic of Mauritius

国土面积：2,040平方公里（世界第180名）  
总人口：1,284,264人（世界第155名，2010年）  
首都：路易港（Port Louis）  
官方语言：英语  
货币单位：毛里求斯卢比（Mauritian Rupee）



毛里求斯是非洲东部一岛国，位于印度洋西南方。西距马达加斯加约800公里，与非洲大陆相距2,200公里。整个国土由几个火山岛组成。除本岛外，还包括了圣布兰登群岛、罗德里格斯岛及阿加莱加群岛。毛里求斯与附近的留尼汪岛（距毛里求斯西南200公里）及罗德里格斯岛等共同组成马斯克林群岛（Mascarene Islands）。马斯克林群岛的形成是由于非洲板块在留尼汪热点上滑动所引起的一连串海底火山爆发，但这地区的火山活动已不再活跃。毛里求斯本岛形成于群岛的中央台地，最高点为位于岛上西南部的比顿山（Mount Piton），海拔828米。现在在台地四周的山丘仍能看到昔日火山口的遗迹。

毛里求斯景色优美。美国著名作家马克·吐温也在其个人游记作品《赤道漫游记》（Following the Equator）中提到：“有人说上帝创造天堂之前先创造毛里求斯，而那个天堂其实是依照毛里求斯创造出来的。”





# 非洲青凤蝶 Blue Swallowtail [ Papilio Zalmoxis ]



非洲青凤蝶是一种大型的凤蝶科蝴蝶，翅展可达14至17cm，其雌蝶体型小于雄蝶。非洲青凤蝶的翅膀颜色有蓝色、绿色及青铜色多种，通常有灰蓝色的后翅，身体中央躯干处则呈金黄色。



[ KM# 40 ] 面值：25 RUPEES

发行时间：1975

材质：25.5000 g., 0.5000 Silver 0.4099 oz. ASW

\* [ KM# 40a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



毛里求斯共和国  
Republic of Mauritius




# 毛里求斯隼 Mauritius Kestrel [ Falco Punctatus ]

毛里求斯隼是毛里求斯特有的一种猛禽，分布在其西南部的森林、山崖及峡谷中。它们是西印度群岛中最独特的物种之一，可能是于上新世（Pliocene）晚期的杰拉阶（距今约258.8—180.6万年）独自演化成的特有物种。

毛里求斯隼的体型大于北美隼。其翅膀已经演变成短而圆，尾巴很长，这适于它们在本地稠密的森林中灵敏和快速地追逐猎物。这种猛禽矫健凶猛，猎食本领非常高明，它既能从高处附身击获森林冠层下树枝上的壁虎，又能在空中追击正在飞行的蜻蜓等昆虫，还常在岛上凌空盘旋，拦路抢劫其他鸟类的劳动果实。

1974年，毛里求斯隼的数量曾只余下4只，当时是世界上最稀有的鸟类。1979年成功人工孵化雏鸟后，它们的数量才逐步回升。



[ KM# 41 ] 面值：50 RUPEES  
发行时间：1975  
材质：32.1500 g., 0.5000 Silver 0.5168 oz. ASW  
\* [ KM# 41a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



毛里求斯共和国  
Republic of Mauritius






# 蒙古国 Mongolia

国土面积：1,564,116平方公里（世界第18名）  
总人口：2,991,272人（世界第133名，2008年）  
首都：乌兰巴托（Ulan Bator）  
官方语言：蒙古语  
货币单位：图格里克（Tögrög）



蒙古国是位于中华人民共和国以北、俄罗斯联邦以南的亚洲内陆国家。深居亚欧大陆内陆，属东亚，是世界第二大内陆国（第一大为哈萨克斯坦）。大部分地区为山地或高原，平均海拔1600米。西部为山地，阿尔泰山自西北向东南蜿蜒。位于中蒙边界上的友谊峰海拔4374米，为全国最高峰。群山之间多盆地和谷地；东部为地势平缓的高地；南部是占国土面积1/3的戈壁地区。

蒙古大部分地区属大陆性温带草原气候，季节变化明显：冬季长，常有大风雪；夏季短，昼夜温差大；春、秋两季短促。每年有一半以上时间为大陆高压笼罩，是世界上最强大的蒙古高压中心，为亚洲季风气候区冬季“寒潮”的源地之一。





# 盘羊 Argali Sheep 【 Ovis Ammon 】

盘羊又叫大头羊、大角羊，是一种生活在中亚高原上的野生羊，也是体型最大的一种绵羊。根据分布地区的不同，可分为9个亚种。盘羊生活在中亚的众多山脉中，其分布地区从阿尔泰山脉、南西伯利亚、蒙古国、西藏、天山山脉一直到尼泊尔和帕米尔高原，它们可以在7000米的高处生存。

盘羊最显著的特征是雄羊头上一对粗壮的弯角。它的角呈螺旋状扭曲一圈多，角外侧有明显而狭窄的环棱，雄羊角自头顶长出后，两角略微向外侧后上方延伸，随即再向后下方及前方弯转，角尖最后又微微往外上方卷曲，故形成明显螺旋状角形。

盘羊的视觉、听觉和嗅觉敏锐，性情机警，稍有动静，便迅速逃遁。常以小群活动，每群数量不多，数只至十多只的较常见。冬季雌雄合群在一起活动，配种时期每只雄盘羊和数只雌盘羊一起生活，配种季节结束后又分开活动。盘羊善于爬山，比较耐寒。它的主要天敌是狼和雪豹。



[ KM# 36 ] 面值：25 TUGRIK

发行时间：1976

材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



蒙古国  
Mongolia



# 双峰骆驼 Bactrian Camel 【Camelus Bactrianus】



双峰骆驼是骆驼的一种，也叫双峰驼。在历史上曾经存在于世界上的很多地方，今天全世界大约有一百四十万头双峰骆驼，但几乎全部是驯养品种。而野生双峰驼，是世界上仅存的真驼属野生种。野生双峰驼一度也被人认为已经灭绝，但最近的研究显示，在中国西北和蒙古国境内还存在着大约950头野生双峰驼。

双峰骆驼的身高超过2米（最高点驼峰的高度），体重超过725公斤。主要以草、树叶和谷物为食，一次最多可以喝下120升的水，其身体特征非常适应于干燥炎热的沙漠气候。它的颈部较长，背部的毛有保护皮肤免受炙热阳光照射的作用。背部生有两个较小的肉驼峰，驼峰内主要是脂肪和结缔组织，在饥饿和营养确乏时逐渐转化为身体所需的热能。

[ KM# 37 ] 面值：50 TUGRIK  
发行时间：1976  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver  
1.0408 oz. ASW



蒙古国  
Mongolia





# 尼泊尔联邦民主共和国

## Federal Democratic Republic of Nepal

国土面积：140,800平方公里（世界第94名）  
总人口：29,331,000人（世界第40名，2010年）  
首都：加德满都（Kathmandu）  
官方语言：尼泊尔语、英语  
货币单位：尼泊尔卢比（Nepalese Rupee）



尼泊尔是南亚山区的内陆国家，位于喜马拉雅山脉。北与中国西藏相接，其余三面与印度为邻。中尼边界的珠穆朗玛峰（尼泊尔称萨加玛塔峰）是全世界最高的山峰。尼泊尔国境呈长方形，略呈西北-东南走向，东西宽约850公里，南北宽约200公里。海拔由北部与中国交界的崇高山脉（海拔4000米以上）向南递减，中部（海拔1000米至4000米）为山地，南部靠近印度地区的海拔较低（1000米以下），并多为茂密林地。喜马拉雅山脉成为尼泊尔和中国的天然国界，包括珠穆朗玛峰在内，世界10大高峰中有8个在尼泊尔境内。海拔1千米以上的土地占全国总面积的一半。东、西、北三面群山环绕，因此尼泊尔自古有“山国”之称。

尼泊尔以海拔分为5个气候区，在北部海拔4800米以上的高山地区，冷季最低气温为-41℃；南部海拔1200米以下的夏季最高气温为45℃。地势高度差造成的气候差异之大为世界所罕见。





# 棕尾虹雉 Himalayan Monal Pheasant [ *Lophophorus Impejanus* ]



棕尾虹雉，又名九色鸟，是雉科虹雉属的一种。主要生活在中国西藏南部、尼泊尔等地，是尼泊尔的国鸟。

棕尾虹雉是典型的高山鸡类，生活在海拔2500~4500米，终年被云雾笼罩着的高山针叶林、高山草甸和杜鹃灌丛之中。白天活动，晚上栖于陡峭的岩石上或杜鹃灌丛中。常成群活动，冬季有时可以结成20—30只的大群。

棕尾虹雉属于大型雉类，体长在70厘米左右。雄雌异色。雄鸟成鸟通体有多种色彩：头部为铜绿色，红色羽冠较长，具匙状羽端。上体羽毛呈铜绿、紫及蓝绿等色且具有金属光泽；翅膀表面呈金属紫色，铜绿色缘。尾羽为棕红色，下体羽毛为黑褐色，嘴角褐色，脚黄绿色或褐绿色。这也是为什么它们被称之为“九色鸟”的原因。雌鸟相比则颜色暗淡，通体羽毛呈棕褐色，有黑色、棕色和黄色纹路。颈部、喉部及下背为白色，尾羽为棕色和黑色，尖端为白色。



[ KM# 839 ] 面值：25 RUPEE  
发行时间：VS2031 (1974)

材质：25.6000 g., 0.5000 Silver 0.4115 oz. ASW

\* [ KM# 839a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



尼泊尔联邦民主共和国  
Federal Democratic Republic of Nepal



# 小熊猫 Red Panda 【Ailurus Fulgens】

小熊猫又名红熊猫、红猫熊、小猫熊。它是一种哺乳类动物，分布在中国南方到喜马拉雅山麓、不丹、印度、老挝、缅甸、尼泊尔等国境内。属于食肉目、小熊猫科。之前曾就它究竟应该列在熊科还是浣熊科一直有争论，最近经过基因分析，认为它与美洲大陆的浣熊亲缘关系最接近，应该单独列为小熊猫科。

小熊猫体长约53-63厘米（不包括尾巴；其粗长的尾巴，可长达47厘米），头圆，四肢粗短；体重约4至6公斤，身体躯干毛为栗色，四肢和腹有些黑色毛，面部白色花纹不像大熊猫那样明显，尾有九个黄白相间的环纹；前爪根骨的一部分突起成手指状，可作为第6个手指抓握物品用，这一点与大熊猫相同。

小熊猫属于夜行性生物，对于温度十分的敏感，无法忍受超过25℃的温度。以果实、根、笋、栓皮栎、昆虫等为食物。



[ KM# 841 ] 面值：25 RUPEE

发行时间：VS2031 (1974)

材质：25.6000 g., 0.5000 Silver 0.4115 oz. ASW

\* [ KM# 839a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



尼泊尔联邦民主共和国  
Federal Democratic Republic of Nepal





# 阿曼苏丹国 Sultanate of Oman

国土面积：309,500平方公里（世界第82名）  
总人口：3,608,545人（世界第133名，2010年）  
首都：马斯喀特（Muscat）  
官方语言：阿拉伯语  
货币单位：阿曼里亚尔（Omani Rial）



阿曼是阿拉伯半岛东南沿海的一个国家，西北与阿拉伯联合酋长国接壤，西面毗邻沙特阿拉伯，西南靠近也门。阿曼的海岸南方和东方临阿拉伯海，东北方则抵阿曼湾。它扼守着世界上最重要的石油输出通道——波斯湾的霍尔木兹海峡。其海岸线总长1700公里。境内大部分是海拔200-500米的高原。东北部为哈贾尔山脉，其主峰沙姆山海拔3352米，为全国最高峰。中部是平原，多沙漠。西南部为佐法尔高原。除东北部山地外，均属热带沙漠气候。全年分两季，5月至10月为热季，气温高达40℃以上；11月至翌年4月为凉季，气温约为24℃。年平均降水量130毫米。





# 狞猫 Caracal [ Caracal Caracal ]

狞猫有时被人称作沙漠猯猫或非洲猯猫。因为和猯猫一样，它们都长着又大又尖的耳朵，大耳朵上都有长长的黑色丛毛。但狞猫和猯猫并不是类似的物种，从体形上比较，狞猫的个头略小，约60-95cm长，且身形瘦长，四肢纤细，它们的尾巴也比猯猫长，约有身长的1/3。狞猫的毛色一般是浅黄棕或深红棕色，腹部、眼睛四周以及下巴的毛发则是白色的。同时，眼角还有一条细细的黑线，一直延伸到它们鼻子的地方。它们那双大耳朵的背面是黑色的。实际上Caracal这个名字就是来自土耳其语“karakulak”，意为“黑耳朵”。

狞猫是一种领域性非常强的猫科动物，它们的体型中等，但是被归于小型猫科。雄性的狞猫一般的体重为13-18公斤（28-40磅），而雌性则较轻一些。现今的基因研究显示，狞猫完全不是猯猫的近亲，反而和薮猫的关系比较近。狞猫身手矫健，常会以比较小的猎物为食，比如跳鼠、沙兔、地松鼠、岩狸等动物。另外，它们的捕鸟技术非常值得一提：它们能跳起几英尺高，将刚起飞的鸟捉住。



[ KM# 60 ] 面值：2-1/2 OMANI RIALS  
发行时间：AH1397 (1976)  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



阿曼苏丹国  
Sultanate of Oman



# 阿拉伯大羚羊 Arabian White Oryx 【Oryx leucoryx】



阿拉伯大羚羊又名阿拉伯羚、阿拉伯直角羚羊或阿拉伯剑羚，是长角羚属中体型最小的成员。它们栖息在阿拉伯半岛的沙漠及草原。于1970年代早期就接近在野外灭绝，现正被列为濒危物种。

阿拉伯大羚羊肩高约1米，重70公斤。它们的毛色接近雪白色，腹部及脚都是褐色的，在头部及颈部之间、前额、鼻子及由角经眼睛至口部都有黑色斑纹。雄羊及雌羊都有直立的环角，长达半米。它们主要吃草及多种不同的植物部份，包括树、芽、香草、果实、块茎及根。它们的群族会跟随雨水去吃新长出来的植物。阿拉伯大羚羊可以几个星期不喝水，研究发现它们主要吃针禾属的植物，因为其花朵有高含量的蛋白质及水份。

阿拉伯大羚羊会在灌木或树下的地上挖坑休息，它们在阿曼的分布地就超过3000平方公里。但2007年6月28日，阿曼的阿拉伯羚羊保护区成为第一个被联合国教育、科学及文化组织除名的世界遗产。理由是阿曼政府大幅减少其面积，用来开采石油。

[ KM# 61 ] 面值：5 OMANI RIALS  
发行时间：AH1397 (1976)  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



阿曼苏丹国  
Sultanate of Oman






**巴基斯坦伊斯兰共和国**  
**Islamic Republic of Pakistan**

国土面积：796,095平方公里（\*不含克什米尔。世界第36名）  
总人口：161,488,000人（世界第6名，2007年）  
首都：伊斯兰堡（Islamabad）  
官方语言：乌尔都语、英语  
货币单位：巴基斯坦卢比（Pakistani Rupee）



巴基斯坦位于南亚，东与印度比邻，南面是印度洋，西与伊朗接壤，西北和阿富汗相连，东北面可通往中国的新疆。在乌尔都语中，“巴基斯坦”这个源自波斯语的字的意思为“圣洁的土地”或“清真之国”。

巴基斯坦全境五分之三为山区和丘陵地，南部沿海一带为不毛荒漠，向北伸展则是连绵的高原牧场和肥田沃土。全国最高峰乔戈里峰（海拔8611米）。喜马拉雅山、喀喇昆仑山和兴都库什山这三条世界上有名的大山脉在巴基斯坦西北部汇聚，形成了奇特的景观。源自中国的印度河进入巴境后，自北向南，长驱2300公里，最后注入阿拉伯海。巴基斯坦除南部属热带气候外，其余属亚热带气候。





# 黑头角雉 Western Tragopan [ Tragopan melanocephalus ]

黑头角雉是一种中等体型、颜色艳丽的角雉，生活在喜马拉雅山西北部。栖息于海拔2400-3600米的温带林区，冬天下降到2000-2800米的针叶林与阔叶林区。主要以树叶嫩、根茎、种子等为食。有时也吃昆虫和其他无脊椎动物。

与其他角雉相似，雄黑头角雉喜欢炫耀其外表，并有蓝色的肉质角。其遇到危险时会发出waa-waa的叫声。相对而言，雄鸟体型较大，长55-60厘米，体重1.8-2.2公斤，羽毛基色为较深的灰色或黑色，身体两侧和脖子为红色，并带有白斑。喉部裸露，为蓝色，头部裸皮鲜红色，虹膜为棕色，嘴为黑色，脚为粉红或灰色。雌鸟体型较小，长48-50厘米，体重1.3-1.4公斤，羽毛颜色为褐灰色，并带有黑色斑纹。



[ KM# 40 ] 面值：100 RUPEES  
发行时间：1976  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW, 38.6 mm.



巴基斯坦伊斯兰共和国  
Islamic Republic of Pakistan



# 恒河鳄 Gavial Crocodile [ Gavialis Gangeticus ]



恒河鳄，又名食鱼鳄、长吻鳄，是长吻鳄科恒河鳄属中唯一品种。恒河鳄身体修长，体色为橄榄绿色。恒河鳄是一种淡水鳄鱼，主要分布在印度河、恒河、马哈拉迪河及布拉玛普特拉河这4条河当中。恒河鳄喜欢栖息于水流又急又深，水质较好的河里。

在所有鳄鱼中，恒河鳄能浸泡在水中的时间最长——可达到1个小时以上。因此爬上陆地后，恒河鳄无法像其他鳄鱼那样用四肢来平稳爬行。


恒河鳄于每年3月至4月产蛋，并于河岸沙地处挖洞筑巢。每次产30至50只蛋，是鳄中唯一每年产卵两窝的种类，而所产的蛋亦是所有鳄鱼当中最大的。雌鳄守着鳄鱼巢时，会变得有点攻击性，是一种警戒心非常强的鳄鱼。与其他鳄鱼不同，它们的口不大，不能载着小鳄鱼，所以孵出小鳄鱼后，雌鳄会引导小鳄鱼到水边。恒河鳄在大约8至12岁时到达性成熟期，届时体长超过3米长。

[ KM# 42 ]    面值：150 RUPEES  
                  发行时间：1976  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW, 42 mm.



巴基斯坦伊斯兰共和国  
Islamic Republic of Pakistan





塞舌尔共和国 Republic of Seychelles

国土面积：445平方公里（世界第198名）  
总人口：80,654人（世界第182名，2007年）  
首都：维多利亚（Victoria）  
官方语言：克里奥尔语、法语、英语  
货币单位：塞舌尔卢比（Seychellois Rupee）



塞舌尔是印度洋中西部一群岛国家。位处东经55°-56°、南纬4°-5°之间，西距肯尼亚和索马里1500多公里，西南和马达加斯加相距七百哩，东北隔海和马尔代夫遥遥相望，全国总面积共约455平方公里，由40个花岗岩岛和45个珊瑚岛组成。

对于这一串热带海洋中的干燥岛屿，在西方人间有看许多传说。早期的阿拉伯人把这一带的水域叫做“哲宁的海”；天方夜谭中的水手辛巴达曾经在这里发现一座富有磁力的神秘山峰，同时还发现有一种体积硕大无比的大鸟，神话中传说，这种大鸟所生下来的小鸟，都是用大象来作点心的。

坐落在普拉兰岛中心的五月谷（Vallee de Mai）是世界上最小的自然遗产，面积只有19.5公顷。因其中7000多棵海椰子树而闻名于世。同时还有许多世界上独一无二的动植物，堪称珍奇大观园。





# 红双棘鰾 Red Squirrelfish [ Dispinus Ruber ]

红双棘鰾是鰾科双棘鰾属下唯一的一种。俗名黑带金鳞鱼。分布于东到萨摩亚、西到红海及南非、北至日本南部、南到昆士兰以及台湾及两广沿海至西沙群岛及南沙群岛等，属于珊瑚礁区近底层肉食性海鱼。

红双棘鰾的特征是它的大眼睛以及前鳃盖骨后下角具一扁平强棘。棘的尖端超过鳃盖膜。体被强栉鳞，鳞不具嵴纹，边缘锯齿较尖锐。背鳍最后鳍棘短于紧连其前面一鳍棘；臀鳍第三鳍棘略等于或短于鳍条长。体红色，体侧具8~9条深红色纵带。



[ KM# 39 ] 面值：50 RUPEES  
发行时间：1978  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



塞舌尔共和国  
Republic of Seychelles



# 白尾鷗 White-tailed Tropicbird [ Phaethon Lepturus ]



白尾鷗是一种热带海洋鸟类，是一种游荡性海鸟，除繁殖期回到原来的繁殖地外，成年在热带海洋中漂泊飞翔。广泛分布在大西洋、印度洋及太平洋海域。它性极活跃，动作轻快、敏捷，常单独在海面上空飞翔。

白尾鷗主要以各种小型表层鱼类、乌贼、甲壳类等海洋动物为食。觅食方式则是通过在水面上空边飞翔边注视着海面，当发现可利用食物后，则从空中直扎到水面捕食。

白尾鷗全身主要为白色。初级飞羽黑色，尖端白色，初级飞羽内侧具宽的白缘，其后白色逐渐增多，到第7枚初级飞羽时则全为白色；外侧次级飞羽纯白色，最内侧次级飞羽和肩羽黑色，具宽的白色羽缘，内侧小翼覆羽白色，其后黑色，中覆羽和大覆羽白色；尾羽具黑色羽轴，中央两枚尾羽特形延长，白色，羽轴黑色。

[ KM# 40 ] 面值：100 RUPEES  
发行时间：1978  
材质：31.6500 g., 0.9250 Silver 0.9412 oz. ASW



塞舌尔共和国  
Republic of Seychelles





## 苏丹共和国 Republic of the Sudan

国土面积：1,886,068平方公里（世界第16名）  
总人口：30,894,000 人（世界第40名，2008年）  
首都：喀土穆（Khartoum）  
官方语言：阿拉伯语  
货币单位：苏丹镑（Sudanese Pound）



苏丹，位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。国家的名字源自于阿拉伯语“Bilad-al-Sudan”，字面意思为“黑（人）的土地”。

苏丹是非洲仅次于阿尔及利亚和刚果民主共和国的第3大国，邻国有埃及、利比亚、乍得、中非共和国、南苏丹、埃塞俄比亚和厄立特里亚。另外，与肯尼亚、埃塞俄比亚交界的伊雷米三角，埃塞俄比亚及苏丹各自宣称拥有所有权，现由肯尼亚管辖。苏丹与埃及在部分国界上亦有争议。

中部是苏丹盆地，尼罗河河谷贯穿，青尼罗河、白尼罗河汇合处一带土质最为肥沃，西部和东部是高原，最高部为南部边境的基涅提山，海拔3187米；苏丹终年炎热，主要属热带莽原和沙漠气候，年降水量自北向南由20多毫米递增至1000毫米以上，北半部多沙漠，南半部多草原、森林和沼泽。

苏丹幅员辽阔，拥有大量的动植物自然资源，是非洲旅游投资价值方面最丰富的国家之一。





# 鲸头鹳 Shoebill [ Balaeniceps Rex ]

鲸头鹳是一种与鹳科相亲的非常大的鸟，它是鲸头鹳科和鲸头鹳属唯一的一个种。它的名称来自于它强大的喙。同时，由于其貌不扬，堪称世界上最丑的鸟类，所以，人称“兽步鸟”也是指它。

鲸头鹳身长可达150厘米，成年鸟羽主要为灰色，幼鸟的羽毛主要为棕色。

鲸头鹳生活在非洲东部热带地区苏丹共和国和赞比亚的巨大沼泽地区。它们在泥水中捕鱼，其食物主要是肺鱼类或类似的鱼。巢则筑在地面上，每次产两枚卵。

鲸头鹳的分类很有争议，传统地它被分为鹳形目，在鸟类DNA分类系统中许多传统不相关的鸟类全部被收录入了鹳形目。最近也有些学者使用比较解剖学的方法认为它与鹳比较接近，其他学者则使用生物化学的手段认为它比较接近鹭科。



[ KM# 70 ] 面值：2-1/2 POUNDS  
发行时间：AH1396-1976  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



苏丹共和国  
Republic of the Sudan



# 河马 Hippopotamus [ Hippopotamus amphibius ]

河马是一种非洲的大型杂食性哺乳类动物，是生物分类法里河马科中的两个延伸物种的其中一个（另一个是倭河马）。河马重2000公斤以上，长3至4米，是陆地上第三大的动物，仅次于白犀牛(2500公斤)与大象(6000公斤)。

河马黑褐色皮肤裸露，仅尾部有少数的刚毛，头大、嘴阔、耳小、尾短，前后肢都比较短，有四指、略有蹼。由于河马的鄂部关节位于较后方，因此双鄂可撑开将近150度。它们的四根獠牙长达4英吋，咬力可达3000磅，一次可吃下100磅的植物。河马的体型虽大却可轻巧的浮在水中，还能在水中待超过30分钟。即使是陆地上第三大的动物，河马在陆地上奔跑的时速还是能达25英哩。长时间曝晒于太阳下后，其皮肤会分泌粉红色的油脂，功能为防止过多的紫外线照射。

尽管他们的身体很像猪和其他陆地上的偶蹄目，他们最亲近的亲戚是鲸目，如鲸鱼、海豚等等。鲸鱼和河马的祖先是来自其他来自六千万年前的偶蹄目分支。最早的河马化石，属于来自非洲的肯尼亚河马属，大约是一千六百万年前。

河马是群居动物，每群大约有40只。寿命为40至50岁。与外型完全相反的是，河马的脾气极为凶残且极易主动攻击其他动物，是世界上最危险的生物之一。



[ KM# 71 ] 面值：5 POUNDS

发行时间：AH1396-1976

材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



苏丹共和国  
Republic of the Sudan





坦桑尼亚联合共和国 United Republic of Tanzania

国土面积：945,087平方公里（世界第30名）  
总人口：37,849,133人（世界第32名，2006年）  
首都：多多马（Dodoma）  
官方语言：斯瓦希里语  
货币单位：坦桑尼亚先令（Tanzanian Shilling）




坦桑尼亚是一个东非国家，位于赤道以南，本土地处维多利亚湖和印度洋之间，北邻乌干达和肯尼亚，西与刚果民主共和国、卢旺达和布隆迪交界，南与马拉维和莫桑比克毗连，西南与赞比亚接壤。大陆海岸线长840公里。东部沿海地区和内陆部分低地属热带草原气候，西部内陆高原属热带高地气候。大部分地区平均气温21-25℃。桑给巴尔的20多个岛屿属热带海洋性气候，终年湿热，年平均气温26℃。位于坦桑尼亚东北部的乞力马扎罗山，海拔5,895米，为非洲最高峰。境内湖泊众多，非洲三大湖泊维多利亚湖、坦噶尼喀湖和马拉维湖均在坦边境线上，

位于首都附近的米库米天然动物园，是世界十大国家野生动物园之一。其中几乎囊括了坦桑尼亚全国所有兽类。园内群山叠翠、灌木丛生、牧草丰盛、溪流遍布，是自然生态保存最完好的一个地方。坦桑尼亚的1/3国土为国家公园、动物和森林保护区。共有塞伦盖提、恩戈罗戈罗等12个国家公园、19个野生动物保护区和50个野生动物控制区。







## 长颈鹿 Giraffe [ Giraffa Camelopardalis ]

长颈鹿是一种生长在非洲的反刍偶蹄动物，是世界上最高的陆生动物。雄性个体高达4.8到5.5米高，重达900公斤。雌性个体一般要小一些。主要分布在非洲的埃塞俄比亚、苏丹、肯尼亚、坦桑尼亚和赞比亚等国。

长颈鹿的长脖子在物种进化的过程中独树一帜，这样它们在非洲大草原上，就可以吃到其他动物无法吃到的、在较高地方的新鲜嫩树叶与树芽。但长颈鹿和其它动物的脖子椎骨同样只有7块，只是它们的椎骨较长，一块椎骨有两公尺长。长颈鹿的蹄直径和餐盘一样大，心脏有0.6米宽。由于长颈鹿的颈部很高，因此当它们低下头时，耳朵后方的瓣膜会调节血压，防止血压过高。长颈鹿灵活的舌头长达10吋，舌头上黏呼呼的口水有时也会滴出来，但口水能够防止舌头在取食刺槐（一种布满尖刺的树冠丛植物）时受伤，舌头和嘴唇上还有一层坚韧的角质隆起能防止被刺槐刺伤。同时由于它们要时常咀嚼从树上摘下的树叶，这就使得长颈鹿的下颚肌肉不停的运动，而脸部因缺少运动而生长缓慢，所以我们可以看到长颈鹿总是一副僵硬的表情。

[ KM# 7 ] 面值：25 SHILINGI

发行时间：1974

材质：25.4000 g., 0.5000 Silver 0.4083 oz. ASW

\* [ KM# 7a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



坦桑尼亚联合共和国  
United Republic of Tanzania



# 黑犀 Black Rhinoceros [ Diceros Bicornis ]

黑犀，也叫黑犀牛，是犀科黑犀属的唯一一种，产于非洲的肯尼亚、坦桑尼亚、喀麦隆、南非、纳米比亚和津巴布韦。尽管名叫黑犀，它们的体表颜色实际上更接近于灰白色，这个名字一般被用来区别于白犀（Ceratotherium simum）。事实上这两种犀牛的区别不在于颜色，而主要在于体型，黑犀要比白犀小许多。

成年黑犀肩高143-160厘米，身长2.86-3.05米，体重在800-1400公斤之间，最重的可达1820公斤，母犀牛要比公犀牛轻。黑犀的一对角为角质，前角较长，一般为50厘米，最长的可达140厘米。有时候还会长出第三支比较小的角。犀牛角的作用主要用于防御、示意和觅食。黑犀的嘴较尖，耳朵较小，而白犀的嘴唇则比较宽，耳朵较大。黑犀的皮肤很厚，能够防止锋利的草插入或划破身体。视力极差，主要依靠听觉和嗅觉来发现敌人。

20世纪，黑犀曾经是所有犀牛中数量最多的一种。但在20世纪后半叶，黑犀的数量急剧下降。根据2003年的资料显示，黑犀的数量仅有约3,610头。



[ KM# 8 ] 面值：50 SHILINGI

发行时间：1974

材质：31.8500 g., 0.5000 Silver 0.5120 oz. ASW

\* [ KM# 8a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



坦桑尼亚联合共和国  
United Republic of Tanzania





# 泰国 Kingdom of Thailand

国土面积：513,115平方公里（世界第49名）  
总人口：66,720,153人（世界第19名，2011年）  
首都：曼谷（Bangkok）  
官方语言：泰语  
货币单位：泰铢（Thai Baht）



泰国是东南亚的一个国家，东临老挝和柬埔寨，南面是暹罗湾和马来西亚，西接缅甸和安达曼海。国境大部份为低缓的山地和高原。地形多变，可分为西、中、东、南四个部份。

泰国西部为山区，是喜马拉雅山脉的延伸他念翁山脉为主的山地，一直由北向南走向。位于清迈府的因他暖山（海拔2,576米）是泰国的最高峰。东北部是呵叻高原，这里夏季极干旱，雨季非常泥泞，不宜耕作。中部是昭披耶河（即湄南河）平原。由曼谷向北，地势逐步缓升，湄南河沿岸土地丰饶，是泰国主要农产地。曼谷以南为暹罗湾红树林地域，涨潮时没入水中，退潮后成为红树林沼泽地。泰国南部是西部山脉的延续，山脉再向南形成马来半岛，最狭处称为克拉地峡。泰国大众也习惯将国家的疆域比作大象的头部，将北部视为“象冠”，东北地方代表“象耳”，暹罗湾为“象口”，而南方的狭长地带则代表了“象鼻”。

泰国大部分地区属于热带季风气候。常年温度不下摄氏18℃，平均年降水量约1000毫米。11月至2月受较凉的东北季候风影响比较干燥，3月到5月气温最高，可达摄氏40-42℃，7月至9月受西南季候风影响，是雨季。10月至12月偶有热带气旋从南海经过中南半岛吹袭泰国东部，但在暹罗湾形成的热带气旋为数甚少且弱。





# 苏门答腊犀牛 Sumatran Rhinoceros [ Dicerorhinus Sumatrensis ]



Critically Endangered  
★ 极危 ★  
International Union for Conservation of Nature

苏门答腊犀牛，是双角犀属的唯一一种，也是现存最小的犀牛。它肩高大约130厘米，体长约240-315厘米，体重约700公斤。苏门犀长有两个突角，这一点与非洲的白犀和黑犀相似，而不同于亚洲的印度犀和爪哇犀。前角较大，通常为15-25厘米，后角较小，通常是少于10厘米。身披厚厚的红棕色的长毛，是世界上最后生存的披毛犀牛。

苏门犀是独居动物，仅在发情与扶养幼仔时相聚。它们会通过挖泥土，排便，或把树苗弯成独特的样式来表示它们的地盘。通常黄昏和清晨出来觅食，白天待在泥池里休息。以小嫩叶、树苗、水果、嫩芽和细枝为食。每天可吃掉50公斤。

苏门犀在东南亚的数量曾经很多，但现在野外仅存300头左右。08年被评为全球十大最濒危的稀有动物物种之一。

[ Y# 102 ] 面值：50 BAHT  
发行时间：1974  
材质：25.5500 g., 0.5000 Silver 0.4107 oz. ASW  
\* [ Y# 102a ] 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



泰国  
Kingdom of Thailand




# 坡鹿 Eld's Deer [ Cervus eldii ]

坡鹿是东南亚特有的一种鹿。它们最初是于1839年在印度东北的曼尼普尔邦被发现的。其下已知有三个亚种。

坡鹿为中型鹿类。其外形与梅花鹿相似，但体形较小且花斑较少。颈、躯体和四肢更为细长，显得额外矫健。

坡鹿多栖息在海拔200米以下的低丘、平原地区。性喜群居，但长茸雄鹿多单独行动。坡鹿的主要食物是青草和嫩树枝叶等，种类有竹节草、丁癸草、鸡占、鹊肾等，也吃番茨叶、嫩稻苗、蔗苗等作物，尤其喜欢吃水边或沼泽地里生长的水草。此外，它还经常舔食盐碱土，以补充身体所需的矿物质和盐分等。



[ Y# 103 ] 面值：100 BAHAT  
发行时间：1974  
材质：31.9000 g., 0.5000 Silver 0.5128 oz. ASW  
\* [ Y# 103a ] 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



泰国  
Kingdom of Thailand





## 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 Bolivarian Republic of Venezuela

国土面积：912,050平方公里（世界第32名）

总人口：26,749,110人（世界第45名，2005年）

首都：加拉加斯（Caracas）

官方语言：西班牙语

货币单位：委内瑞拉玻利瓦尔（Venezuelan Bolívar）



委内瑞拉是一个位于南美洲北部的国家，北临加勒比海与大西洋，东有圭亚那，南为巴西，西边则与哥伦比亚接壤，而在委内瑞拉外海则有阿鲁巴、荷属安地列斯（皆为荷兰的海外自治领土）与特立尼达和多巴哥等岛屿邦国。首都加拉加斯是个滨海的港口，也是该国最大城。

委内瑞拉是南美洲最重要的产油国家，境内主要的石油蕴藏区是国境西北角的南美洲第一大湖——马拉开波湖（Lago de Maracaibo）。马拉开波湖是一个潟湖，北端是以一条34英里长的海峡与委内瑞拉湾相连，后者是加勒比海的一部分。

其境内的安赫尔瀑布是世界海拔最高、落差最大（979米）的瀑布。位于东南部的丘伦河上，当地印第安人管它叫“出龙”。瀑布下游地区是著名的世界自然遗产“卡奈马国家公园”。





# 美洲豹 Jaguar [ Panthera Onca ]

美捷豹，也叫美洲虎，是豹属动物（猫科中继虎和狮之后的第三大物种），同时也是西半球最大型和最强健的猫科动物，外表型态和豹极为相似，但较粗壮，圆斑中有黑点。是美洲地区唯一的豹属动物。现时美洲豹分布于墨西哥至中美洲大部分地区，南至巴拉圭及阿根廷北部。

美洲豹的行为和栖息的习性与虎相似。美洲豹较喜欢栖于树木茂密的热带雨林，但它们亦会广泛分布于高山、平原等不同的地方。它们生活于多水之地，且跟虎一样，是喜欢游泳的猫科动物。美洲豹爱独行，是蛰伏突袭的掠食者。它们是顶级掠食者和基石物种（keystone species），在平衡生态系统和调节猎物数量方面占著举足轻重的地位。美洲豹有异常惊人的咬力，让它们能咬穿爬行动物的厚皮或甲壳，甚至直接把猎物的颅骨从耳部咬穿，对猎物的脑部造成致命的损伤。

美洲豹在很多美洲土著文化的神话中常常出现，如马雅和阿兹特克。

如今，美洲豹的数量正由于栖息地的减少而不断下降，被IUCN列为近危物种。



[ Y# 46 ] 面值：25 BOLIVARES

发行时间：1975

材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



委内瑞拉玻利瓦尔共和国  
Bolivarian Republic of Venezuela



# 大犛犛 Giant Armadillo [ Priodontes maximus ]



大犛犛，也叫巨犛犛，是贫齿目犛犛科大犛犛属的唯一一种。分布于南美洲东部的巴拉圭、阿根廷、委内瑞拉、圭亚那和巴西的亚马孙河流域等地靠近水边的地区。

大犛犛体型较大，通常体重为27千克，最重可达32.3千克，身长89.5厘米，身体的三分之一到五分二的部分是尾巴。在它的头顶上被有鳞片，就像戴着一付头盔，两侧长着一对圆形的小耳朵，嘴巴尖而长，口中生有100多颗同型的牙齿，超过一般哺乳动物数倍之多，但这些牙齿均弱小而无力，并且缺少门齿和犬齿，不能进行自卫，老年以后逐渐脱落。身体可以分为前、中、后三段，外面都被有一层由小骨片组成的、如瓷砖般排列的骨质鳞片，如同硬甲一般保护身体，前段和后段的骨质鳞片连成像乌龟壳一样的整块结构，不能伸缩，中段的鳞片呈条带状环绕而形成“绊”，有筋肉相连，其中3—4条在颈部，11—13条在背部，可以自由伸缩，从而增加身体的灵活性。拖在身后的长长的尾巴和四肢上也均有鳞甲，鳞片之间长有稀疏而粗糙的毛。腹部没有鳞，生长着较为浓密的毛。它的四肢十分粗壮，趾上的爪尖锐而强硬，十分有力，其中第三爪较为弯曲，全长20厘米左右，但只适于挖掘而不适于与天敌搏斗。

大犛犛以白蚁和蚂蚁为食。由于视力很差，只能依靠灵敏的嗅觉寻觅食物，大犛犛能够准确地找到在1米以下深度隐藏的蚂蚁、白蚁等的巢穴。用利爪挖开之后，再用它富有粘液而伸缩自如的舌头进行舔食。



[ Y# 47 ] 面值：50 BOLIVARES  
发行时间：1975  
材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



委内瑞拉玻利瓦尔共和国  
Bolivarian Republic of Venezuela





**刚果民主共和国**（原：扎伊尔共和国）  
**Democratic Republic of the Congo**（Republic of Zaire）  
国土面积：2,345,409平方公里（世界第11名）  
总人口：71,712,867人（世界第19名，2011年）  
首都：金沙萨（Kinshasa）  
官方语言：法语  
货币单位：刚果法郎，原：扎伊尔（Zairean Zaire）



扎伊尔共和国是1971年10月27日到1997年5月17日期间，刚果民主共和国的国名。此时共和国的统治者是知名的独裁者蒙博托。1997年蒙博托被推翻后，扎伊尔共和国的国名改回刚果民主共和国。

刚果民主共和国的位置在非洲中部，位于非洲赤道心脏地带，地大物博，为非洲仅次于阿尔及利亚的第2大国。北邻中非共和国，东北和南苏丹接壤。东邻东非地堑，峭壁深谷，水深奇秀，与乌干达、坦桑尼亚、卢旺达和布隆迪相接。南与安哥拉毗连，东南界赞比亚，西界刚果。西南部刚果河下游一隅濒大西洋，海岸线只有37公里长。这个横跨赤道的国家，国境占刚果盆地的绝大部份，并且被支流密布的刚果河所灌溉；除中下游有较大的平原外，其余东、北、南三面都是被高原和山地所环绕，其中又以南方和东南方的山岭最为高峻。平均海拔由600米到1500米。刚果民主共和国以刚果河为主流，其他均为支流。民主刚果矿产资源极为丰富，素有“原料仓库”之称。






# 山地大猩猩 Mountain gorilla [ Gorilla Beringei Beringei ]

山地大猩猩是东部大猩猩两个亚种之一。它们栖息在维龙加山脉的艾伯丁裂谷的山地森林中，分布在海拔2225-4267米这一区间内。

山地大猩猩由于它粗鲁的面孔和巨大的身材看起来十分怕人。但实际上，它们是非常平和的素食者。山地大猩猩大部分时间都在非洲森林里闲逛、嚼枝叶或睡觉。山地大猩猩的毛较其他大猩猩长及黑，故它们可以生活在高海拔及较冷的地方。双脚较似人类的脚。学者可以从鼻子来分辨个别的山地大猩猩，故此从鼻子的相片及描绘来进行监察。

山地大猩猩是高度两性异形的，雄性可以比雌性重两倍。成年雄性的头颅骨有更大的矢状嵴及枕骨嵴，故头颅骨更接近圆锥体。这些嵴连接强壮的颞骨肌肉。成年雌性亦有这些嵴，但却没有雄性的那么显着。

山地大猩猩是高度群居的，且有相对稳定的雄性与雌性关系生活。雌性之间的关系则相对地疏离。它们并非以地域为分界，成年雄性会保护自己的族人而非疆界。



[ KM# 9 ]  
面值：2-1/2 ZAIRES  
发行时间：1975  
材质：28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



刚果民主共和国  
Democratic Republic of the Congo



# 霍伽狓 Okapi [ *Okapia johnstoni* ]

霍伽狓是一种一直到1901年才在非洲扎伊尔森林发现的大型哺乳动物。它是长颈鹿科中的一种偶蹄动物。它与长颈鹿有亲缘关系，是长颈鹿唯一的尚未灭绝的近亲。不过第一眼它看上去更像一匹马，由于它的后部有黑白交替的条纹，使它看上去非常像一匹斑马。

霍伽狓的皮毛是巧克力色的，有红色和绛红色的丝绒光泽。臀部和腿的上部则有水平的黑白条纹。有人认为这些条纹是在密集的热带雨林中作为“跟随我”的标志，以便让幼兽可以紧跟母兽。此外它们还可以作为伪装。小腿白色或淡棕色。面部黑白色。颈和腿显然延长，但没有达到长颈鹿的地步。霍伽狓的舌头是蓝色的，很长（约30厘米），很灵活。霍伽狓使用它们的舌头来卷取树上的嫩叶。霍伽狓还可以使用它们的长舌头来清洁它们的眼睛和耳朵。

除绿叶和嫩叶外霍伽狓还吃草、蕨类植物、果实和真菌。

霍伽狓是昼行性动物，一般单身，只在交配时会碰到一起。



[ KM# 10 ]

面值：5 ZAIRE

发行时间：1975

材质：35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



刚果民主共和国

Democratic Republic of the Congo





## 赞比亚共和国 Republic of Zambia

国土面积：752,614平方公里（世界第38名）  
总人口：11,668,000人（世界第70名，2005年）  
首都：卢萨卡（Lusaka）  
官方语言：英语  
货币单位：克瓦查（Zambian Kwacha）



赞比亚是中部非洲的一个内陆国家。与刚果民主共和国、坦桑尼亚、马拉维、莫桑比克、津巴布韦、博茨瓦纳、纳米比亚和安哥拉相邻。

赞比亚因赞比西河而得名，这是非洲第四大河，长2660千米，流经西部和南部。著名的维多利亚大瀑布就位于这条河上，它也是世界七大自然奇观之一，是赞比亚的著名旅游胜地。赞比亚境内大部分地区为海拔1000 - 1500米高原，地势大致从东北向西南倾斜。全境按地貌分为五个区：东北部东非大裂谷区，北部加丹加高原区，西南部卡拉哈里盆地区，东南部卢安瓜—马拉维高原区和中部卢安瓜河盆地区。位于东北边境的马芬加山海拔2164米，为全国最高点。

赞比亚属热带性气候，因位于海拔1,000-1,300米的台地湿度低，比起其他热带非洲国家气温则较为凉爽。







# 驴羚 Kafue Lechwe [ Kobus Leche ]

驴羚，又译列羚，是一种生活在博茨瓦纳奥卡万戈三角洲、赞比亚喀辅埃湿原及班韦乌卢沼泽及刚果民主共和国东南方的羚羊。

驴羚肩高90至100厘米及体重70至120公斤。它们有着金褐色的毛皮，白色的腹部及黑色的脚部。雄性的颜色较深。角呈竖琴形，只有雄性才有角。后脚比其他羚羊较长，这是为方便它们从沼泽泥土中奔驰。

驴羚出没于沼泽地区，因它们以水中植物为食。它们亦会以及膝的水作为保护，免受猎食者的侵袭。它们的脚有着抗水物质包裹，容许它们在这种环境下快速奔驰。

驴羚是白天生活的动物。它们聚集成群的数量可达多头。族群一般都是同性别，但在交配季节则会两性混杂。在班韦乌卢沼泽生活的族群毛色较深，是驴羚的一个亚种，故称为黑驴羚（学名Kobus leche smithemani）。生活在喀辅埃湿原的另一个亚种是喀辅埃河驴羚（学名是Kobus leche kafue），而其他地区的则称为赤驴羚（学名Kobus leche leche）。



[ KM# 18 ]

面值：5 KWACHA

发行时间：1979

材质：25.3100 g., 0.9250 Silver 0.7527 oz. ASW

\* [ KM# 18a ] : 28.2800 g., 0.9250 Silver 0.8410 oz. ASW



赞比亚共和国  
Republic of Zambia



# 泰塔隼 Taita Falcon [ Falco Fasciinucha ]

泰塔隼是分布在南部非洲的一种小型隼类。它分布在肯尼亚、赞比亚、津巴布韦和南非共和国的东北部。

泰塔隼体长10-12英寸，身体上最显著的特点是白色的颈部和颈后部明显的红褐色斑块，翼下覆羽则呈现出均匀的红褐色。它的飞行速度很快，非常善于在空中狩猎。



















[ KM# 19 ]    面值：10 KWACHA    发行时间：1979  
材质：31.6500 g., 0.9250 Silver 0.9412 oz. ASW  
\* [ KM# 19a ]： 35.0000 g., 0.9250 Silver 1.0408 oz. ASW



赞比亚共和国  
Republic of Zambia



















【附录】  
世界自然基金会 野生动物纪念币 ——1970s 汇总

阿富汗 Afghanistan	1978		[KM# 978] 250 AFGHANIS		[KM# 980] 500 AFGHANIS
		雪豹 Snow Leopard		白鹤 Siberian Crane	
博茨瓦纳 Botswana	1978		[KM# 11] 5 PULA		[KM# 12] 10 PULA
		南非剑羚 Gemsbok		山羚 Klipspringer	
哥伦比亚 Colombia	1978		[KM# 264] 500 PESOS		[KM# 265] 750 PESOS
		奥里诺科鳄 Orinoco Crocodile		栗腹蜂鸟 Chestnut-Bellied Hummingbird	
哥斯达黎加 Costa Rica	1974		[KM# 200] 50 COLONES		[KM# 201] 100 COLONES
		绿海龟 Green turtles		西印度海牛 West Indian Manatee	
埃塞俄比亚 Ethiopia	1977		[KM# 61] 10 BIRR		[KM# 62] 25 BIRR
		胡秃鹫 Bearded Vulture		山薮羚 Mountain Nyala	
斐济 Fiji	1978		[KM# 41] 10 DOLLARS		[KM# 42] 20 DOLLARS
		黑脸鸚雀 Pink-billed parrotfinch		黄金宝螺 Golden cowrie	
福克兰群岛 Falkland Islands	1979		[KM# 11] 5 POUNDS		[KM# 12] 10 POUNDS
		座头鲸 Humpback Whale		短翅船鸭 Falkland Steamer Duck	
冈比亚 Gambia	1977		[KM# 17] 20 DALASIS		[KM# 18] 40 DALASIS
		距翅雁 Spur-winged Goose		土豚 Aardvark	





















印度尼西亚 Indonesia	1974	 [KM# 39] 2000 RUPIAH	 [KM# 40] 5000 RUPIAH
		爪哇虎 Javan tiger	婆罗洲猩猩 Bornean Orangutan
约旦 Jordan	1977	 [KM# 31] 2-1/2 DINARS	 [KM# 32] 3 DINARS
		细角瞪羚 Rhin Gazelle	巴勒斯坦太阳鸟 Palestine Sunbird
马拉维 Malawi	1978	 [KM# 15] 5 KWACHA	 [KM# 16] 10 KWACHA
		斑马 Zebra	黑马羚 Sable Antelope
马来西亚 Malaysia	1976	 [KM# 19] 15 RINGGIT	 [KM# 20] 25 RINGGIT
		马来野牛 Malayan Gaur	马来犀鸟 Rhinoceros Hornbill
毛里求斯 Mauritius	1975	 [KM# 40] 25 RUPEES	 [KM# 41] 50 RUPEES
		非洲青凤蝶 Blue Swallowtail	毛里求斯隼 Mauritius Kestrel
蒙古国 Mongolia	1976	 [KM# 36] 25 TUGRIK	 [KM# 37] 50 TUGRIK
		盘羊 Argali sheep	双峰骆驼 Bactrian Camel
尼泊尔 Nepal	1974	 [KM# 839] 25 RUPEE	 [KM# 841] 50 RUPEE
		棕尾虹雉 Himalayan Monal Pheasant	小熊猫 Red panda
阿曼 Oman	1976	 [KM# 60] 2-1/2 OMANI RIALS	 [KM# 61] 5 OMANI RIALS
		狞猫 Caracal	阿拉伯大羚羊 Arabian White Oryx





巴基斯坦 Pakistan	1976	 [KM# 40] 100 RUPEES	 [KM# 42] 150 RUPEES
		黑头角雉 Western Tragopan	恒河鳄 Gaval Crocodile
塞舌尔 Seychelles	1978	 [KM# 39] 50 RUPEES	 [KM# 40] 100 RUPEES
		红双棘鲷 Red Squirrelfish	白尾鹑 White-tailed Tropicbird
苏丹 Sudan	1976	 [KM# 70] 2-1/2 POUNDS	 [KM# 71] 5 POUNDS
		鲸头鹳 Shoebill	河马 Hippopotamus
坦桑尼亚 Tanzania	1974	 [KM# 7] 25 SHILINGI	 [KM# 8] 50 SHILINGI
		长颈鹿 Giraffes	黑犀 Black Rhinoceros
泰国 Thailand	1974	 [Y#] 102 50 BAHT	 [Y#] 103 100 BAHT
		苏门答腊犀牛 Sumatran Rhinoceros	坡鹿 Eld's Deer
委内瑞拉 Venezuela	1975	 [Y#] 46 25 BOLIVARES	 [Y#] 47 50 BOLIVARES
		美洲豹 Jaguar	大犛狨 Giant Armadillo
刚果民主共和国 (原扎伊尔) Democratic Republic of the Congo	1975	 [KM# 9] 2-1/2 ZAIRES	 [KM# 10] 5 ZAIRES
		山地大猩猩 Mountain gorillas	獐狃狓 Okapi
赞比亚 Zambia	1979	 [KM# 18] 5 KWACHA	 [KM# 19] 10 KWACHA
		驴羚 Kafue Lechwe	泰塔隼 Taita Falcon

